外科精義

竇太師流注指要賦

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

外科精義

齊德之纂集

本館據古今醫統正
脈全書本影印初編
各叢書僅有此本

外科精義目録

卷上

論瘡腫診候入式法
論榮衛色脉參應之法
論持手訣消息法
論三部所主臟腑病證
論脉證名狀二十六種所主病證
論三部脉所主證候
論三部脉所主雜病法訣
論診候肺疽肺痿法

論將護忌愼法
論瘡疽腫虛實法
辯瘡腫淺深法
辯膿法
辯瘡疽癤腫證候法
辯瘡疽善惡法　砭鍼法
貼熨法　湯漬瘡腫法
針烙瘡腫法　灸療瘡腫法
內消法　追蝕瘡疽腫法
托裏法　止痛法

用藥增損法
療瘡腫攉變通類法
論五發疽　論癰疽
論附骨疽　論陰瘡
論時毒　論諸瘡
論丁瘡腫
辯丁腫十三種形色禁忌
論瘰癧治法　論痔瘻
卷下
漏蘆湯　化毒丹

內消丸
內消升麻湯
牡礪大黃湯
地黃煎丸
皂角煎丸
苦參丸
連翹散
枳殼丸
托裏黃芪湯
托裏當歸湯
五利大黃湯
五香連翹湯
和血通氣丸
槐角煎丸
苦參散
肺風丸
竹葉黃芪湯
五香湯
托裏茯苓湯
托裏散

托裏玄參散　內托散
內補散　內塞散
香粉散　止痛當歸湯
黃芪茯苓湯　內補防風散
伏梁丸　溫經丸
木香湯腫湯　升麻湯腫湯
湯腫升麻湯　猪蹄湯
甘草大豆湯　湯腫湯
洗毒湯　浴毒湯
何首烏散　八僊散

消毒湯　熨風散
應痛丸　黃芪丸
梔子仁湯　葛根牛蒡子湯
通氣散　白丁香散
金銀花散　皂蛤散
十香膏　犀角膏
乳香膏　白龍膏
消毒膏　磨風膏
天麻膏　善應膏
靈應膏　翠玉膏

追毒散　廻瘡錠子
射膿丸　替鍼丸
治瘰癧 并馬老鼠瘡　翠霞散
搜膿散　引膿散
乳香散　釣苓散
截疳散　抵聖散
青金錠子　白龍散
桃紅散　檳榔散
金黃散　生肌散
水澄膏　拔毒散

金露散　消毒散
大檳榔散　天麻散
決効散　水銀膏
平肌散　神黃散
博金散　金傷散
完肌散　定血散
皂莢錠子　漏蘆湯
玉粉散　香蘞散
紫金散　通耳丹
菖蒲錠子　寸金錠子

薰痔散　通靈丸
三神丸　玉芝飲子
平和飲子　玄參丸
犀角散　防風散
烏金散　劉守真瘡論
沒藥膏　必効散
烏金散　抵聖散
應効散　白金散
如聖散　天蛾散
必効散　蛤粉散

治小兒丹瘤
治破傷風并洗頭風藥
紫參丸
治眼
治痔瘡
寸金丹
迴瘡蟾酥錠子
四聖旋丁散
萬應膏
治亦白口瘡
治小兒疳口瘡
烏龍丸
萬靈丸
治吹奶
洗痔
牙疳藥
乳香托裏散
天丁散
治小兒面濕瘡
治乾濕疥癬

治湯火燒燙瘡　治破傷風
治破傷　治風狗咬破傷風
論炮製諸藥及單方主療瘡腫法

外科精義目錄

外科精義卷上

醫學博士選充御藥院外科太醫
明　新安　後學

論瘡腫診候入式法

夫醫者人之司命也脉者醫之大業也蓋醫家苟不明脉則如冥行索途動致顛覆矣夫大方脉婦人小兒風科必先診脉後對證處藥獨瘡科之流多有不診其脉候專攻治外或有證候疑難別召方脉診察於瘡科之輩甘嘗淺陋之名噫其小哉如是原夫瘡腫之生皆由陰陽不和氣血凝滯若不診候何以知

陰陽勇怯血氣聚散耶由是觀之則須信療瘡腫於診候之道不可闕也歷觀古今治療瘡腫方書甚多其間診候之法畧而未詳比夫諸科甚有滅裂愚雖不才輒取黃帝素問難經靈樞甲乙及叔和仲景扁鵲華陀千金外臺聖惠總録古今名醫諸家方論之中診候瘡腫之說簡編類次貫成篇帙首載診候入式之法次論血氣色脉參應之源後明脉之名狀所主證候及瘡腫逆從之方庶使爲瘡腫科者覽此則判然可曉了無凝滯於胷次一朝臨疾診候至此則察逆從決成敗若黑白之易分耳

論榮衛色脉參應之法

夫天地之道曰陰與陽陰陽在人曰血與氣蓋血者榮也氣者衛也榮者榮於中衛者衛於外所以榮行脉中衛行脉外脉者血氣之先也血非脉則焉能榮於中氣非脉則焉能衛於外二者相資而行內則通於五臟六腑十二經絡外則濡於九竅四肢百節萬毛晝夜循行如環無端以成其度會於寸口變見於脉故曰氣血者人之神也脉者氣血之神也所以治病之始五決爲紀蓋五決者五臟之色脉也脉應於內色應於外其色之與脉當相參應故曰能合色脉

可以萬全也凡爲醫先須調明色脉況爲瘡科若於此不精雖聰惠辯博亦不足委也

論持手訣消息法

夫診候之脉法常以平旦爲紀陰氣未散陽氣未動飲食未進血氣未亂經脉未隆絡脉調勻故乃可診有疾之脉若遇倉卒病患不拘此論内經所謂持脉有道以虛靜爲保但可澄神靜慮調息凝心視精明察五色聽音聲問所苦方始按寸尺別浮沉以此參照決死生之分矣復觀患人身形長短肥瘦老少男女性情緩急例各不同故曰形氣相得者生三五不

調者病謂如室女足冠脉當濡而弱嬰兒孺子之脉細而疾三四歲者呼吸之間脉當七八至爲平比夫常人特不同耳大抵男子先診左手女子先診右手男子左脉大則順女子右脉大則順大凡診脉先以中指揣按掌後高骨骨下爲關得其關位然後齊下兩左右二指若臂長人踈排其指若臂短人密排其指三指停穩先診上指曰寸口浮按消息之中按消息之重按消息之上竟消息之下竟消息之推而外之消息之推而內之消息之然後先關後尺消息之一類此若診得三部之中浮沉滑澁遲疾不調何病

所主外觀形色內察脉候參詳處治以忠告之不可輕言談笑亂說是非左右瞻望舉止忽畧此庸醫也

論三部所主臟腑病論

夫診候之道醫者之難精也若非燈下苦辛勤於記誦參師訪友晝夜不遑造次顛沛寤寐俯仰存心於此安能知神聖之玅哉古人曰按其脉知其疾命曰神以悟其探賾索隱之玅也又曰切其脉治其病謂之巧以明其指別之功也蓋三指相去毫釐之近主病若千里之遠觀夫指別之功世人固以爲難命曰神豈容易可至哉當考於經脉有三部寸關尺也從

魚際至高骨却行一寸曰寸從寸上一分曰魚際從寸至尺曰尺澤寸後尺前爲關關前爲陽即寸口也關後爲陰即尺脉也陽出陰入以關爲界寸主上焦頭手皮毛關主中焦膜及腰尺主下焦小腹及足此三部所主大畧也又有左右兩手三部爲之六脉也又有人迎氣口神門所主又各不同蓋左手關前曰人迎右手關前曰氣口兩關之後一分即曰神門故脉法讀曰肝心出左肺脾出右腎爲命門俱出尺部竈竈敖神皆見寸口所謂左手關前心之部也其經手少陰與手太陽爲表裏小腸合爲府左手關上肝

之部也其經足厥陰與足少陽爲表裏膽合爲府左手關後腎之部也其經足少陰與足太陽爲表裏膀胱合爲府右手關前肺之部也其經手太陰與手陽明爲表裏大腸合爲府右手關上脾之部也其經足太陰與足陽明爲表裏胃合爲府右手關後命門之部也其經手厥陰與手少陽爲表裏三焦合爲府此謂六部所主藏腑十二經之義也又脉要精微論曰尺內兩旁則季脇也尺外以候腎尺裏以候腹中附上左外以候肝內以候膈右外以候胃內以候脾上附上右外以候肺內以候胷中左外以候心內以候

亶中前以候前後以候後上竟上者胃喉中事也下竟下者小腹腰股膝脛足中事也麤大者陰不足陽有餘爲熱中也來疾去徐上實下虛爲厥顛疾來徐去疾上虛下實爲惡風也故中風者陽氣受也有脉俱沉細數者少陰厥也沉細數散者寒熱也浮而散者爲恟仆諸浮而數者皆在陽爲熱其有躁者在手諸細而沉者皆在陰則爲骨痛其有靜者在足數動一代者病在陽之脉也洩及便膿血諸過者切之濇者陽氣有餘也滑者陰氣有餘也陽氣有餘爲身熱無汗陰氣有餘爲多汗身寒陰陽有餘則無汗身

寒推而外之內而不外者有心腹積也推而內之外而不內者身有熱也推而上之上而不下者腰足清也推而下之下而不上者頭項痛也按之至骨脉氣少者腰脊痛而身有痺也已上諸疾若非指明心了烏可得而妙也又平人氣象論曰一呼脉再動一吸脉亦再動呼吸定息脉行五動爲以大息不大不小不長不短不滑不澁不浮不沉不遲不數命曰平人平人者不病也蓋平人之常氣禀乎胃胃氣者平人之常氣也所以人常禀氣於胃故脉以胃氣爲本也正理論曰穀入於胃脉道乃行合靈樞經云胃爲水

敎之海也又曰脉應四時曰平信夫四時之脉皆以胃氣爲本謂春弦夏洪秋毛冬石春之胃脉微弦曰平餘皆倣此逆四時則病矣若診婦人之脉妊身則慎勿亂投湯散其婦人之脉診得少陰脉動甚則有子也又曰陰搏陽則有子也又曰身汗而無脉者即有妊也蓋重身者問其月事觀其體貌然後主治不可忽也又經曰察色按脉先別陰陽蓋陰陽者天地之道也是以治病者必求其本本於陰陽寒暑四時五臟之根也以脉言之則浮沉也以部言之則尺寸也故經云脉者陰陽之法以應五臟是謂呼出心與

肺吸入腎與肝呼吸之間脾受穀味其脉在中也以浮沉論之則曰浮者陽也沉者陰也應在臟腑則浮而大散者心也浮而短濇者肺也所以心肺俱浮也牢而長者肝也按之而大舉指來實者腎也所以肝腎俱沉也遲緩而長者脾也脾爲中州所以脉在中也仲景曰大浮數動滑皆陽也沉濇弱弦微皆陰也陽者熱也陰者寒也所以寒則脉來沉而遲熱則脉來浮而數故曰諸數爲熱諸遲爲寒無如此驗也脉經曰諸浮爲風諸緊爲痛諸伏爲聚諸弦爲飲芤者失血長則氣治短則氣病濇則煩心大則病進浮爲

在表沉爲在裏遲爲在臟數爲在腑又形壯脉細少氣不足以息者危形瘦脉大胃中氣多者弊形氣相得者生三五不調者病三部九候皆相失者死此先聖診脉之大法也故曰凡治病則察其形氣色澤治之無候其時也所以形氣相得者生色澤以浮者病易已脉從四時者可治脉弱似滑者是有胃氣此皆易治也若形氣相失或色夭不澤及脉逆四時或脉實益堅皆不可治經所謂必察四難而明告之又若病熱脉靜泄而脉大脫血脉實汗後脉躁此皆難治也若瘡疽之人膿血大泄脉滑數者難治也凡瘦膿

多或如清泔脉滑大散寒熱發渴者治之無功也若患肺瘡者咳嗽膿血脉見洪滑治之難痊矣大凡診脉見浮數應當發熱而反惡寒雖頭項拘急四肢煩痛或復戰慄渴甚者但有痛處欲發瘡腫也

論脉證名狀二十六種所主病證

夫脉之大體二十六種此診脉之紀綱也細而論之毫釐少差舉治必遠總而言之逆從虛實陰陽而已兩者議之以要其中謹於諸家脉法中撮其機要翦去繁蕪載其精義

浮脉之診浮於指下按之不足舉之有餘再再尋之

狀如太過瞥瞥然見於皮毛間其主表證或爲風或爲虛浮而大散者心也浮而短濇者肺也浮而數者熱也浮數之脉應發熱其不發熱而反惡寒者瘡疽之謂也

洪脉之診似浮而大按舉之則泛泛然滿三部其狀如水之洪流波之湧起其主血實積熱瘡腫論曰脉洪大者瘡疽之病進也如瘡疽結膿未成者宜下之膿潰之後脉見洪大則難治若自利者不可救治也

滑脉之診實大相兼往來流利如珠按之則累累然

滑也其主或爲熱或爲虛此陽脉也瘡疽之病膿未潰者宜内消也膿潰之後宜托裏也所謂始爲熱而爲虛也

數脉之診按之則呼吸之間動及六至其狀似滑而數也若浮而數則表熱也沉而數則裏熱也又曰諸數爲熱仲景曰脉數不時見則生惡瘡也又曰肺脉洪數則生瘡也診諸瘡洪數者裏欲有膿結也

散脉之診似浮而散按之則散而欲去舉之則大而無力其主氣實而血虛有表無裏瘡腫膿潰之後

而煩痛尚未痊退者診其脉洪滑麤散難治也以其正氣虛而邪氣實也又曰肢體沉重肺脉大則斃謂浮散者也

芤脉之診似浮而輭按之中央空兩邊實其主血虛或爲失血瘡腫之病診得芤脉膿潰後易治以其脉病相應也

長脉之診按之則洪大而長出於本位其主陽氣有餘也傷寒得之欲汗出自解也長而緩者胃脉也百病皆愈謂之長則氣治也

牢脉之診按之則實大而弦且沉且浮而有牢堅之

意若瘰癧結腫診得牢脉者不可内消也

實脉之診按舉有力而類結曰實經曰邪氣勝則實久病則虛人得此最忌瘡疽之人得此宜急下之以其邪氣與臟腑俱實故也

弦脉之診按之則緊而弦其似緊者爲弦如按弦而不移緊如内繩而轉動以此爲異春脉浮弦而平不時見則爲飲爲痛主寒主虛瘡疽論曰弦洪相搏外緊内熱欲發瘡疽也

緊脉之診似弦而緊按之如切繩而轉動其主切痛積癖也瘡腫得之氣血沉澁也亦主痛也

濇脉之診按之則散而復來舉之則細而不足脉濇則氣濇也亦主血虛瘡腫潰後得之無妨也

短脉之診按舉則不及本位內經曰短則氣病以其無胃氣也諸病脉短皆難治也瘡腫脉短真氣短也

細脉之診按之則縈縈如蜘蛛之絲而欲絶舉之如無而似有細而微其主亡陽衰也瘡腫之病脉來細而沉時直者裏虛而欲變證也

微脉之診按之則輭小而極微其主虛也真氣復者生邪氣勝者危瘡腫之病潰後脉微而勻舉自差

也

遲脉之診按舉來遲呼吸定息方得三至其狀似緩而稍遲瘤疾得之則善新疾得之則正氣虛憊瘡腫得之潰後自痊

緩脉之診按舉似遲而稍駛於遲仲景曰陽脉浮大而濡陰脉浮大而濇陰陽同等謂之緩脉見長緩百疾自瘳凡諸瘡腫潰後其脉濇遲緩者皆易愈以其脉候相應是有胃氣也

沉脉之診舉之不足按之方見如爛綿其主邪氣在臟也水氣得之則逆比陰脉也瘡腫得之邪氣深

也

伏脉之診比沉而伏舉之則無按之至骨方得與沉相類而邪氣益深矣

虛脉之診按之不足遲大而輭輕舉指下豁然而空經曰脉虛則血虛血虛生寒陽氣不足也瘡腫脉虛宜托裏和氣養血也

輭脉之診按之則如帛在水中極輭而沈細亦謂之濡其主胃氣弱瘡腫得之補虛排膿托裏

弱脉之診似輭而極微來遲而似有仲景曰微弱之脉綿綿如瀉漆之絕其主血氣俱虛形精不足大

抵瘡家沉遲濡弱皆宜托裏

促脉之診按之則去數來時一止而復來仲景曰陽盛則促主熱畜於裏也下之則和瘡腫脉促亦急下之

結脉之診按之則往來遲緩時一止而復來仲景曰陰盛則結經曰促結則生代則死

代脉之診按之則往來動則中止不能自還因而復動者曰代脉也代者氣衰也諸病見之不祥大凡瘡腫之病脉促結者難治而況見代脉乎

動脉之診見於關上無頭尾如豆大厥厥然而動搖

者是也脉經曰陰陽相搏故謂之動動於陽則陽氣虛而發厥動於陰則陰氣虛而發熱是陽生於尺而動於寸陰生於寸而動於尺不可不辯也

論三部脉所主證候

夫寸關尺者脉之位也浮沉滑濇者脉之體也奠位分體指文語證者診脉之要道也脉經曰大凡診候兩手三部脉滑而遲不浮不沉不長不短去來齊等者無病也

寸口脉浮者傷風也緊者傷寒也弦者傷食也浮而緩者中風也浮而數者頭痛也浮而緊者膈上寒

脇下冷飲也沉而緊者心下寒而積痛沉而弱者虛損也緩而遲者虛寒也微弱者血氣俱虛也弦者頭痛心下有水也雙弦者兩脇下痛也偏絕者不遂也俱絕者不治也濈濈如羹上肥者陽氣微也連連如蜘蛛絲者陽氣衰也

關上中焦胃腹中事去來徐而緩者無病也浮者腹滿而不欲食胃虛脹也滑者客熱在胃也數者熱結中焦也沉伏者中焦水氣或嘔逆而吞酸也弱者胃氣虛也雖有虛熱不可大攻須防熱去則生寒也牢而實者腹滿嚮嚮嘖塞而不通或復大痛

澀者氣逆也芤則瀉血濇堅大實按之不減而有力者中焦實有結伏在胃也微浮者積熱不消蚘動心悸也

尺主下焦腰腎膝脛足中事也尺脉浮者風熱小便難也沉者腰背痛而腎氣不足數者臍下熱痛小便赤色而惡寒也遲者下焦寒而陰虛也緊者臍下小腹急痛也緩者脚弱下腫而痿痺也弱者下冷而腎氣衰也輭者脚不收而風痺小便難也伏者小腹痛而痃癖穀不化也細者瀉泄而下冷也芤者小便澀血而下虛也牢而小者足膝寒痺脚

下隱隱疼痛也細而急者筋攣不能行也來而斷絕者男子小腹有滯氣也婦人月水不利也

論三部脉所主雜病法訣

夫三部之中俱見一脉所主雜病畧而言之脉經曰陽邪來見浮洪陰邪來見微細水穀之邪來見實堅寒癖之邪來見弦小又曰浮而滑者宿食也短而滑者酒病也遲而滑者脹滿也洪而大者傷寒也浮而數者傷風也浮而急者飲食不消脾不磨也沉而弦者寒氣結而陰痛也浮而緩者皮膚不仁也滑而散者癱瘓也遲而緩者寒癥也浮而濇者霍亂也弱而

濇者反胃也緊而滑者吐逆也短而數者心痛也弦而數者爲癆也緊而急者尸遁也實小而堅者病在內而冷也浮滑而緊者病在外而熱也短而急者病在上也長而緩者病在下也長而弦者病在肝也滑而洪者病在心也微而輭者病在脾也浮而濇者病在肺也沉而緊者病在腎也又訣曰諸浮爲風或爲虛也諸緊爲痛或爲積也諸濇爲痺諸弦爲飲諸數爲熱諸遲爲寒芤則爲失血輭則爲虛若脉沉沉澤澤四肢不仁者亡祟也或大而懈懈者社祟也若脉来乍大乍小乍短乍長者鬼祟也

論診候肺疽肺瘘法

夫肺者五臟之華蓋也處於胷中主於氣候於皮毛勞傷血氣腠理虛而風邪乘之內感於肺也則汗出惡風咳嗽短氣鼻塞項強胷脇脹滿久久不瘥已成肺瘘也風中於衛呼氣不入熱至於榮則吸而不出所以風傷皮毛熱傷血脉風熱相搏氣血稽留蘊結於肺變成瘡疽診其脉候寸口脉數而虛者肺瘘也數而實者肺疽也肺瘘之候久嗽不已汗出過度重亡津液便如爛瓜下如豕脂小便數而不渴渴者自愈欲飲者欲瘥此由肺多唾涎沫而無膿者肺瘘也

其肺瘡之候口乾喘滿咽燥而渴甚則四肢微腫咳唾膿血或腥臭濁沫胷中隱隱微痛者肺疽也又聖惠口中府隱隱而微痛者肺疽也上肉微起者肺瘡也中府者穴也在雲門下一寸六分乳肋間動脉應手陷中也是以候始萌則可救膿成則多死若欲知有膿者但診其脉若微緊而數者未有膿也緊甚而數者已有膿也又内經曰血熱則肉敗榮衛不行必將爲膿大凡肺瘡當咳嗽短氣胷滿時唾膿血久久如粳米粥者難治若嘔膿而不止者亦不可治也其嘔膿而自止者自愈其脉短而濇者自痊浮大者難

治其面色當白而反面赤者此火之剋金皆不可治

論將護忌慎法

大凡有瘡疽生皆只如黍粟粒許大其狀至微人多不以爲急此蘊大患宜速辯之不可自忽若能防之於未形理之於未成或朝覺而夕治求治於良醫則必無危困矣若因循慢忽詢於庸醫致令膿血結聚委之於命束手待斃不以去道遠乎以致筋骨敗遺穿通臟腑死者十有八九矣可不慎歟蓋患瘡疽之人托命庸醫任意措置危殆立至若用良醫則可保痊愈用醫之際不可不擇辯之何難若能飽讀經書

久詳證候湯藥熟閑洞明色脉性情仁善孝義忠信臨事不惑處治有決方爲良醫委用勿疑然後要在病人自克不可恚怒悲憂叫呼忿恨驕恣情性信任口腹馳騁勞役惟宜清靜恬澹耐煩爲宜於患人左右止息煩雜切忌打觸罵物諸惡音聲爭辯是非呪罵鬬毆及産婦嬉男體氣不潔帶酒腥羶鷄犬乳兒孳畜禽獸並須遠離設或親友重意問疾者可以預嘱徐行低聲欵曲伺候禮畢躬退勿令嗟呀驚怪話舊引其遠賞宴樂遠別親戚牽惹情懷但恐病人心緒淒愴尤不可亂舉方藥徒論虛實惑亂患人凝滯

不決祇合方便省問不可久坐多言勞倦病人深不
長便夫侍患者宜須壽近中年情性沉厚勤謹耐煩
仁慈智惠全在調以粥藥無失時節勿令於患人左
右彈指嗟咨掩淚竊言感激病人甚不利便飲食之
間忌慎非細不可不載畜中勿食驢馬駝騾猪狗牛
羖羊等肝雜魚鼈鼈蝦蟹及淹浥臭陳自死病倒之
類慎勿嘗啖飛禽之中忌食鵝鴨鴻鷹雀鶴鴛鴦鷺
鷺鳩鴿鴉鷄雉及能學人言者慎勿食之野獸之中
忌食獐鹿狐兎虎豹熊豺及爪牙害人有毒蟲獸并
父母自本命生屬忌慎勿嘗啖菜蔬之中忌食黃瓜

茄子蘭香芸薹胡荽生菜蕈芥菌瓠韮蒜葱薤慎勿食之果木之中忌食桃杏棗栗李柰梨梅輭棗紅柿櫻桃胡桃榛松林檎及諸蟲蚘未熟之果慎勿食之若其瘡疽膿潰腫消氣血虛弱則可食羊肉鵪鶉蔓菁薑醬瓜薤蘿蔔及黃白糧米細米稀粥輭飯若至肌肉漸生思想滋味則宜食白熟酥餅蕙粥羹湯熟輭温和稀稠得中製造如法勿令太飽此時猶忌饅頭蒸餅餺飥餛飩肉角煎餅及炙煿燠烳煎炒鹹酸油膩腊肥魚肉若至肌膚欲平惡肉去盡瘡口收斂之際尚忌起立行步揖待賓客房酒宴會嗔怒沐浴

登陟臺榭運動肢體寒暑勞倦正宜調節飲食保攝以待瘡瘢平復精神如故氣力完全萬無所忌百日內慎勿觸犯之

論瘡疽腫虛實法

夫瘡疽膿潰腫毒浸展證候危惡者須辯虛實況夫虛者難補實者易瀉補瀉之法不可輕用若或少差利害甚大然而虛實證多端不可不辯有瘡之虛實有臟腑氣血上下真邪各有虛實故不同也分而言之則腫起堅硬膿稠者瘡疽之實也腫下輭慢膿稀者瘡疽之虛也瀉痢腸鳴飲食不入嘔吐無時手足

並冷脉弱皮寒小便自利或小便時難大便滑利聲音不出精神不爽者悉藏腑之虛也大便硬小便澁飲食如故腸滿膨脹胃脘痞悶肢節疼痛口苦咽乾煩躁多渴身熱脉大精神昏塞者悉藏腑之實也凡諸瘡疽膿水清稀瘡口不合聚腫不赤肌寒肉冷自汗色脫者氣血之虛也腫起色赤寒熱疼痛皮膚壯熱膿水稠粘頭目昏重者氣血之實也頭疼鼻塞目赤心驚咽喉不利口舌生瘡煩渴飲冷睡語咬牙者上實也精滑不禁大便自利腰脚沉重睡卧而不寧者下虛也肩項不便四肢沉重目視不正睛不了了

食不知味音嘶色敗四肢浮腫者真氣之虛也腫煩尤甚痛不可近積日不潰寒熱往來大便祕澀小便如淋心神煩悶恍惚不寧者邪氣之實也又曰真氣奪則虛邪氣勝則實又曰諸痛爲實痒爲虛也又曰診其脉洪大而數者實也微細而輭者虛也虛則補之和其氣托裏也實則瀉之疎利而自導其氣內經謂血實則決之氣虛則掣引之

辯瘡腫淺深法

夫瘡候多端欲辯淺深直須得法若不素知方論而妄生穿鑿者如大匠捨其繩墨以意度量安能中於

規矩哉嘗聞古人有言曰多則惑少則得簡而論之則瘡疽堅舉有三種高而輭者發於血脉腫下而堅者發於筋骨肉皮色不相辯者發於骨髓又曰凡療瘡疽以手按摇瘡腫根牢而大者深也根小而浮者淺也又驗其人初生瘡之時便覺壯熱惡寒拘急頭痛精神不寧煩躁飲冷者其患瘡疽必深也若人雖患瘡疽起居平和飲食如故其疾浮淺也惡瘡初生其頭如米粟微似有痛痒誤觸破之即瘥展覺有深意速服犀角湯及漏蘆湯通氣丸等取通利疎暢兼用浴毒湯溻漬之類若浮淺者紝貼膏求差以此推

之淺深之辯始終之次者也

辯膿法

夫瘡腫之疾毒氣已結者不可論內消之法即當辯膿生熟淺深不可妄開視其可否不至於危殆矣凡瘡疽腫大按之乃痛者膿深也小按之便痛者膿淺也按之不甚痛者未成膿也若按之即復者有膿也不復者無膿也非也必是水也若發腫都軟而不痛者血瘤也發腫日漸增長而不大熱時時牽痛者氣瘤也氣結微腫久而不消後亦成膿此是寒熱所爲也留積經久極陰生陽寒化爲熱以此潰必多成瘻

宜早服內塞散以排之諸癰瘤疣贅等至年衰皆自內潰理於年壯可無後憂也又凡瘡癰疽以手掩其上大熱者膿成自輭也若其上薄皮剝起者膿淺也其腫不甚熱者膿未成也若患瘰癧結核寒熱發渴經久不消者其人面色瘵黃被熱上蒸已成膿也至於臟腑腸胃內瘡內疽其疾隱而不見目既不見手不能近所爲至難可以診其脉而辯之亦可知矣有患胃脘癰者當候胃脉人迎者胃脉也其脉沉細者氣逆則甚甚則熱聚胃口而不行胃脘而爲癰也若其脉洪數者膿已成也設脉遲緊雖膿未就已有瘀

血也宜急治之不爾則邪毒內攻腐爛腸胃不可救也又肺癰論曰始萌則可救膿成即死不可不慎也又久咳膿如粳米粥者不治嘔膿而止者自愈也又腸癰論曰或遶臍生瘡膿從瘡出者有出臍中者惟大便下膿血者自愈也

辯瘡疽癰腫證候法

夫瘡疽癰腫其名甚多載之紛紜方書百緒及至臨疾治之無據不知所以內經曰知其要者一言而終不知其要者流散無窮愚雖不才姑揣其要而言之熱發於皮膚之間是以浮腫根小至大不過二三寸

者癰也六腑積熱騰出於外肌肉之間其發暴甚腫皮光輭侵展廣大者癰也五臟風積熱攻煽於肌骨風毒猛暴初生一頭如痦瘟白焦枯觸之應心者疽也夫癰疽發於六腑若燎原之火外潰膚肉疽生五臟沉溷難療若陶室之燧內消骨髓癰則易療惟難將息而遲瘡疽則難療易得痊復夫癰與瘡初生並宜灸之謂其氣本浮達以導其熱令速暢也疽則烙不宜灸謂其氣本深沉須達其原也凡瘡疽生於外皆由熱毒蘊於內明乎三者腫毒丹瘭可以類推矣蓋皮膚微高起而肌厚或痛或痒移走無常者謂之

腫有因風而得之者有因風熱相搏而得之者腫硬色白因熱而得之者腫嫩色赤因風熱相搏而得之者久久而不消熱勝於風若不即治血不流通與氣乘之以成膿也又曰風多則痒熱多則痛此爲驗也又有丹毒者謂人身忽然變赤如塗丹之狀故謂之丹毒世俗有云赤癗或因有瘡誤而相觸四畔嫩赤謂之瘡癗凡丹毒之疾皆遊走不定狀如雲氣者是也小兒得之最忌百日之內謂之胎癗以其氣血嫩弱臟腑柔脆難任鑱針所以忌也又頸腋之間而生結核初如豆粒或如梅李核累累相連歷歷三五枚

久久不消以漸長大或發寒熱者謂之瘰癧有風毒者得於風熱毒者得之於熱氣毒者得之於氣悉由風熱邪氣蘊經所成證候不同治之者亦各異矣

辯瘡疽善惡法

夫瘡疽證候善惡逆從不可不辯從來醫瘡槩舉五善七惡殊不知此特謂腸胃之內臟腑瘡疽所論之證也發背腦疽別有善惡之證載之于後蓋七惡者煩躁時嗽腹痛渴甚或泄痢無度或小便如淋者一惡也膿血既洩腫脹尤甚膿色敗臭痛不可近二惡也目視不正黑睛緊小白睛青赤瞳子上看三惡也

喘粗短氣恍惚嗜卧四惡也肩背不便四肢沉重五惡也不能下食服藥而嘔食不知味六惡也聲嘶色敗唇鼻青赤面目四肢浮腫者七惡也動息自寧飲食知味一善也便利調勻二善也膿潰腫消水鮮不臭三善也神彩精明語聲清亮四善也體氣平和五善也病有證合七惡皮急緊而如善者病有證合五善而皮緩虛如惡者夫如是者豈淺識之所知哉只知五善併至則善無以加矣七惡併至見惡之極矣愚意裁之凡患瘡疽之時五善之中乍見一二善證瘡亦囘也七惡之內忽見一二惡證宜深懼之大抵

證候瘡疽之發虛中見惡證者不可救也實證無惡候者自愈大凡膿潰之後而煩疼尚未痊者診其脉洪滑麤散者難療微濇遲緩者易痊此善惡之證於診候之中亦可知也發背腦疽及諸惡瘡別有五逆之證者白睛青黑而眼小服藥而嘔傷痛渴甚腫項中不便音嘶色敗者是爲五逆其餘熱渴痢嘔蓋毒氣入裏臟腑之傷也當隨證以治之

砭鑱法

夫上古制砭石大小者隨病所宜也內經謂針石砭石鑱針其實一也今時用鑱者從聖濟總録丹毒論

曰法用鑱割出血明不可緩也合偏鵲云病在血脉者治之以砭石此舉素問血實宜決之又氣血形志論曰形樂志樂病生於內治之砭石蓋砭石者亦東方來爲其東方之民其病多瘡瘍其法宜砭石砭石之用自有證候非止丹癗也但見腫起色赤遊走不定宜急鑱之先以生油塗赤上以鑱鑱之要在決洩其毒然而此法不可輕用忌其太深內經所謂刺皮無傷肉以其九鍼之用而各有所宜也砭鑱之法雖治瘡疽不可輕用也

貼熨法

夫瘡腫之生於外者由熱毒之氣蘊結于內也蓋腫於外有生頭者有漫腫者有皮厚者有皮薄者有毒氣深者有毒氣淺者有宜用温藥貼熁者有宜用凉藥貼熁者有可以乾換其藥者有可以濕換其藥者深淺不同用藥亦異是以不可不辯也若瘡腫初生似有頭者即當貼温熱藥引出其熱毒火就燥之義也於四畔赤煖處搗生寒藥貼熁之折伏其熱勢驅逐其邪惡撲火之義也夫生寒藥勢氣力精全性味雄健或有療者不本物理皆通用藥草膏之類有勢力微欲使厄瘡者敵其勇夫不亦難乎又有粗工不

審逆從便用寒藥敷貼趁逐邪毒復入于內歸于肝心十死八九矣大抵敷貼之法欲消散腫毒血脉疎通寒熱逆從斷其去就焉慎不可執方無權安能散于鬱結不成膿乎其腫皮厚者以故帛布或以紙花于塗藥貼癤之待其藥乾換腫皮薄者即用疎紗或薄紙塗藥貼癤之其藥未乾即當換之若至膿潰之後即貼温肌生肉膏藥要在逐臭腐排惡汁取死肌生良肉全藉温熱膏劑之力也切勿用寒涼之藥水調貼之夫血脉喜温而惡寒若著冷氣過理即血滯難療矣

湯潰瘡腫法

夫湯潰瘡腫之法宜通行表發散邪氣使瘡內消也蓋湯水有蕩滌之功古人有論瘡腫初生經一二日不退即須用湯水淋射之其在四肢者湯潰之其在腰腹背者淋射之其在下部委曲者浴漬之此謂踈導腠理通調血脉使無凝滯也且如藥二兩用水二升爲則煎取一升半以淨帛或新綿蘸藥水稍熱湯其患處漸漸喜湯淋浴之稍涼則急令再換慎勿冷用夫血氣得寒則凝澁得熱則淳澤日用五七次病甚者日夜不住或十數次腫消痛止爲驗此治瘡腫

神良之法也

鍼烙瘡腫法

夫瘡疽之疾證候不一鍼烙之法實非小端蓋有淺有深有遲有速宜與不宜不可不辯蓋疽腫皮厚口小腫多膿水出不快者宜用鍼烙癤皮薄惟用鍼以決其膿血不可烙也如有未成膿已前不可以諸藥貼熁湯漬救療以待自消久久不消內潰成膿即當弃藥從其針烙當用火鍼如似火筯磨令頭尖如棗核樣圓滿用燈焰燒須臾作炬數搵油燒令赤於瘡頭近下烙之一烙不透即須再烙令透要在膿水易

出不假按抑近代良賤貧富倉卒之際但以金銀鐵鋌其樣如鍼者可通用之實在洩其毒也或只以木炭熟火猛燒通赤蘸油烙之尤妙烙後實者撚髮爲紲虛者以紙爲紲於紲上醮藥紲之上以帛攤温熱輭粘膏藥貼之常令滋潤勿令燥也夫瘡疽既作毒熱聚攻蝕其膏膜肌肉腐爛若不鍼烙毒氣無從而解膿淤無從而泄過時不烙反攻其內內既消敗欲望其生豈可得乎嗟乎此疾針烙取差實爲當理然忌太早亦忌稍遲嘗見麤工不審其證淺深妄施針烙之法或瘡深針淺烙毒氣不得泄以致內潰或瘡淺烙

深誤傷良肉筋骨腐爛或抑擦掀動加益煩痛或針之不當別處作頭或即時無膿經久方潰遂使痛中加痛真氣轉傷詳其所由不遇良醫也以此推之凡用醫者不可不擇縱常醫療之得痊者幸矣

灸療瘡腫法

夫疽則宜灸不宜烙癰則宜烙不宜灸丹瘤腫毒宜溻漬之腫皮光輭則鍼開之以洩其毒治瘡之手法迨不過此而各有所宜故聖惠方論曰認是疽瘡便宜灸之一二百壯如菉豆許大灸後覺似瘃痛經一宿乃是火氣下徹腫內熱氣被火導之隨火而出所

以然也若其瘡痒宜隔豉餅子灸之其餅須以椒薑鹽葱相和爛搗捏作餅子厚薄如折三錢以來當瘡頭豉餅子上灸之若覺太熱即擡起又安其上餅子若乾更換新者尤佳若其瘡痛即須急灸壯數多爲妙若其膿已成者慎不可灸即使針開之即得瘥也若諸瘡經久不瘥變成瘻者宜用硫黃灸法灸之其法硫黃一塊可瘡口大小安之別取少許硫黃於火上燒用釵尖挑起點硫黃令著三五遍取膿水乾差爲度若其發背初生即宜上餅灸法灸之初覺背上有瘡疹痒癗異認是發背即取淨土水和捻作餅子

徑一寸厚二分貼著瘡上以艾作炷灸之一炷一易餅子其瘡粟米大時可灸七七炷其瘡如錢許大日夜不住灸以瘥爲度已上數法並依本方一一親驗所以載之愚謂瘡醫自幼至老凡所經驗必須寫之宜記疳瘻惡瘡諸醫不驗者取蟑蟟剪去兩頭安瘡口上以艾灸之七壯一易不過七枚無不効者又法用乞火婆虫灸之同前法累驗之神効人皆祕之往往父子不傳又法赤皮蒜搗爛焊作餅子一如豆豉餅子灸法灸之彌佳

內消法

夫瘡疽丹腫之生皆由陰陽不調榮衛凝澁氣血不流之所生也古人有言曰陽滯於陰則生瘡陰滯於陽則生疽瘡疽之生有內有外內生於臟腑胃腹之中外則生於膚肉筋骨之表發無定處夫鬱滯之本則因氣血不流蒸氣不能外達留滯而成內熱瘡疽所生焉若初覺氣血鬱滯皮肉結聚腫而未潰特可疎滌風熱通利臟腑一二行徐次諸湯漸潰即得內消矣不然則治之稍慢毒熱不散反攻其內致令膿血之聚也內經謂治病必求於本蓋瘡疽本乎中熱之鬱結不通也其風邪寒氣所聚也治之宜温熱之

劑和血令內消也辯之有法須認風寒則腫硬色白熱毒則瘀腫色赤以爲異也如有氣已結聚不可論內消之法宜用排膿托裏之藥此皆先後之次也

追蝕瘡疽腫法

夫瘡瘍生於外皆由積熱蘊於內內經謂血熱肉敗榮衛不行必將爲膿留於節腠必將爲敗蓋瘡疽膿潰爛之時頭小未破瘡口未開或毒氣不出疫痛難任者所以立追蝕膿之方法使毒外泄而不內攻惡肉易去好肉易生也若其瘡經其血出不止者則未可經於瘡上摻追蝕之藥待其熟可經方經若其瘡

紝之痛應心根者亦不可以強紝之悞觸其瘡痛必倍變證不無不可不慎也若瘡癰膿成未破於上薄皮剥起者即當用破頭代鍼之劑安其上以膏貼之膿出之後用搜膿化毒之藥取効如神矣若膿血未盡便用生肌斂瘡之劑務其早愈殊不知惡肉不盡其瘡早合後必再發不可不慎也

托裏法

夫瘡疽丹腫結核瘰癧初覺有之即用内消之法經久不除氣血漸衰肌寒肉冷膿汁清稀毒不出瘡口不合成聚腫不赤結核無膿外證不明者並宜托裏

膿未成者使膿早成膿已潰者使新肉早生血氣虛者托裏補之陰陽不和托裏調之大抵托裏之法使瘡無變壞之證凡爲瘡醫不可一日無托裏之藥然而寒熱溫涼煩渴利嘔臨證宜審其緩急耳

止痛法

夫瘡疽之證候不同寒熱虛實皆能爲痛止痛之法殊非一端世人皆謂乳没珍貴之藥可住疼痛殊不知臨病制宜自有方法蓋熱毒之痛者以寒涼之劑折其熱則痛自止也寒邪之痛以温熱之藥熨其寒則痛自除矣因風而有痛者除其風因濕而痛者導

其濕燥而痛者潤之塞而痛者通之虛而痛者補之實而痛者瀉之因膿鬱而閉者開之惡肉侵潰者引之陰陽不和者調之經絡祕澁者利之臨機應變方爲上醫不可執方而無權也

用藥增損法

古人用藥因病制宜治不執方隨病增損療積聚補益可用丸藥以從舊不改方增損蓋瘡疽危要之際證候多種安有執方之論固可臨時加減以從其法只如發背腦疽惡丁腫膿潰前後虛而頭痛者於托裏藥內加五味子恍惚不寧加人參茯苓虛而發熱

者加地黃栝蔞根往來寒熱者并潮熱者加柴胡地骨皮渴不止者加知母赤小豆大便不通者加大黃芒硝小便不通者加木通燈草虛煩者加枸杞子天門冬自利者加厚朴四肢厥逆者加附子生薑嘔逆者加丁香藿香多痰者加半夏并陳皮膿多者加當歸川芎痛甚者加芍藥乳香肌肉遲生者加白斂官桂有風邪者加獨活防風心驚怯者加丹砂口目瞤動者加羌活細辛愚雖不才自幼及老凡治瘡疽常依此法加減用藥取効如神後之學者宜細詳焉

療瘡腫權變通類法

夫瘡疽之病治療多方總而論之各有所宜補瀉淋
溻及敷掃貼熨鍼鑱灸烙用之不同蓋知其道也舉
治必効昧於理者利害不無嘗見以寒療熱以熱療
寒古今之通論也又有檢方療病妄製加減以意裁
之自以爲可殊不知病有逆從治有緩急法有正權
方有奇偶用有輕重夫醫者意也得其意然後能變
通也達其變通者悟其道而省其理也則左右逢其
源矣愚雖不才晷陳萬一嘗見治寒以熱而寒彌甚
治熱以寒而熱彌熾者何也蓋不知五臟有陰陽之
性其可因其類而取之也假如心實生熱者當益其

腎腎水滋熱將自除腎水虛生寒當補心心火旣降寒將自除此所謂寒之而熱者取之陰熱之而寒者取之陽也又寒因熱用熱因寒用要在通其理類而已又聞微者逆之甚者從之何謂也蓋治寒以熱必涼而行之治熱以寒必溫而行之此亦欲其調和也其間有正有權者何也蓋病有微有甚微者逆治理之正也甚者從治理之權也然爲瘡科於補瀉汗下標本逆從正權之理烏可闕而不知也大凡治療瘡疽之要法曰初覺熱毒發熱鬱結而作瘡疽一二日宜先服五利湯蕩滌邪氣疎通臟腑令內消也古今

湯法謂切剉吹咀如麻豆大以猛火急煎無令過熟欲其速利也次有丸散宣導血脉漸次消磨令緩散也助以淋溻調和榮衛行經絡也更當膏潤温養蕉磨傅四畔貼熨之藥順其陰陽也追蝕托裏汗下調補臨時製宜淺深緩急自有等差男女貴賤亦當別論晉尚書楮澄曰寡婦尼僧異於妻妾雖無房室之勞而有憂思之苦此深達其情者也又仲景云物性剛柔緊居亦異治亦不同也所以黄帝與四方之問岐伯舉四治之能況病之新舊形志樂苦豈可執方無權以求其愈疾哉亦有瘡疽腫痛初生一二日便

覺脉沉細而煩悶臟腑弱而皮寒邪毒猛暴恍惚不寧外證深沉者亦宜即當用托裏散或增損茯苓湯及溫熱之劑以從治之

論五發疽

夫五發者謂癰疽生於腦背眉髯鬢是也大槩論之分爲三等一者疽也二者癰也三者癤也夫疽初生如黍米大痒痛有異快觸破之即燃展四畔赤腫沉悶牽引胸肋疼痛數日之後漸覺肌膚壯熱惡寒煩渴腫暈侵展爛漿汁出積日不潰抑之則流血者謂之發背疽也其發於腦者爲腦疽也其發於鬢眉髯

者以類呼也又有初生其狀無頭腫闊三四寸始覺注悶疼痛因循數日皮光微軟者甚則亦令人發熱惡寒頭痛煩渴者謂之發背癰也又有初生一頭色浮赤而無根腫見於皮膚之間大小一二寸者癤也三者之候惟疽最重此疾初生皆曰滋味與厚衣衣服厚暖則表易招寒滋味過多則五臟生熱臟腑積熱則血脉不流而毒氣凝滯邪氣伏留熱搏於血血聚則肉潰成瘡淺則爲癤實則爲癰深則爲疽矣亦有因服金石發動而患此疾者亦有平生不服金石藥而亦患此疾者蓋由上祖曾服餌者其毒氣流傳

子孫此病初生認是疽則宜速療之若氣實之人急服五香連翹湯漏蘆湯若年幾未五十少壯實者可服五利大黃湯化毒丸取通利臟腑一二行瘡頭上用追毒散之類貼温熱膏劑更溻腫湯潰毒湯淋溻之如此調治以待膿成已前不可以諸藥救療以安患人之心慎勿惱觸著至膿成敗潰宜服五香湯及內托裏散茯苓湯當歸托裏散之類渴不止者服竹葉黃芪湯乳香散勿爲大熱服大黃朴硝苦寒之藥若因服利藥而利不止者死矣若瘡中惡肉未退膿水不快者即用追蝕之藥或鉞子紲之上用鹿角散

以醋熬爲糊貼之惡肉退去好肉漸生即用搜膿散翠霞散之類紝之若瘡中毒氣未盡慎勿早斂忌早上生肌之藥縱得平復必再發其間調理次第臨時制宜將護忌慎之法耳

論癰疽

夫瘡腫之患莫大乎癰疽然而癰疽何以別之經所謂榮衛稽留於經脉之中則澁不行血脉不行則陽氣鬱遏而不通故生寒熱穢毒之氣騰出於外畜結爲癰久而不散熱氣乘之腐化爲膿然而骨髓不焦枯腑臟不傷敗可治而愈也何爲疽五臟風毒積熱

毒熱熾甚下陷肌膚骨髓皆枯血氣涸竭其腫色夭堅如牛領之皮故命曰疽癰者其腫皮薄以澤此其候也癰疽之生有內有外內生胃腹臟腑之中外生膚肉筋骨之表凡此二毒發無定處而有常名夫鬱滯之本始於喜怒憂樂不時飲食居處不節或金石草藥之發動寒暑燥濕之不調使陰陽之不平而蘊結外使榮衛凝澁而腐潰輕者起於六腑浮淺而爲癰氣行經絡而浮也重者發於五臟沉澁而爲疽氣行經絡而沉也明乎二者腫毒丹疹可以類推矣

論附骨疽

夫附骨疽者以其毒氣深沉附著於骨也此疾與賊風相類而不同人不能辨治之悞矣蓋附骨疽者由秋夏露卧爲冷折之風熱伏結附骨成疽賊風之候由風邪之氣搏於骨節故其痛深徹骨髓遇寒則痛甚附骨疽痛而不能轉初按之應骨皮肉微急洪洪如肥狀者是也其賊風皮骨不甚熱而索索惡寒時復汗出常欲熱熨痛處即得少寬其附骨疽初時但痛無時乍寒乍熱而無汗者經久不消極陰生陽寒化爲熱而潰也賊風不治久而變爲彎曲偏枯所以不同也認是賊風則服引越脾治風之劑即得差矣

認是附骨疽急宜服漏蘆湯或五香連翹散疎下之次用內消升麻湯及湯潰膏貼之類縱不能消亦得浮淺及有緩疽石疽與附骨疽亦相類矣異者蓋緩疽石疽皆寒氣所作深伏於骨髓之間有腫與皮肉相似若疼而堅硬如石故謂之石疽緩疽其熱緩慢積日不潰久乃亦紫黯色皮肉俱爛故名曰緩疽此二者其治初覺便宜補虛托裏温熱之劑以取消矣其次調治臨疾制宜故不復具載矣

論陰瘡

夫陰瘡者大槩有三等一者濕陰瘡二者妬精瘡三

者陰蝕瘡又曰下疳瘡蓋濕瘡者由腎經虛弱風濕相搏邪氣乘之瘙痒成瘡浸淫汗出狀如疥癬者是也妬精者由壯年精氣盈滿又曠房室陰上生瘡赤腫作害妨悶痒痛者是也陰蝕瘡者由腎臟虛邪熱結下焦經絡瘡濕氣血不行或房勞洗浴不潔以致生瘡隱忍不醫瘀腫尤甚由瘡在裏措手無方疼痛注悶或小便如淋陰丸腫痛是也或經十數日潰爛血膿肌肉侵蝕或血出不止以成下疳若身體壯熱煩渴惡寒宜急治之以大豆甘草湯漬之漬毒湯者洗浴之服五香連翹湯漏蘆湯等疎之更以截疳抵

聖散乾糝之四畔用磨風膏温潤之後以將護忌慎之渴不止者服竹葉黃芪湯大便轐者宜服托裏茯苓調治之夫如是則無不差矣

論時毒

夫時毒者爲四時邪毒之氣而感之於人也其候發於鼻面耳項咽喉赤腫無頭或結核有根令人增寒發熱頭痛肢體痛甚者恍惚不寧咽喉閉塞人不識者將爲傷寒便服解藥一二日腫氣增益方悞始召瘡醫原夫此疾古無方論世俗通爲丹瘤病家惡言時毒切恐傳染考之於經曰人身忽經變赤狀如塗

丹謂之丹毒此風熱惡毒所爲謂之丹癗與天時毒特不同耳蓋時毒者感四時不正之氣初發狀如傷寒五七日之間乃能殺人治之宜精辯之先診其脉滑數浮洪沉緊弦濇皆其候也蓋浮數者邪氣在表也沉濇者邪氣深也認是時毒氣實之入急服化毒丹以攻之熱實以五利大黃湯下之其有表證者解毒升麻湯以發之或年高氣輭者五香連翹湯主之又於鼻內嚏通氣散取十餘嚏作効若嚏藥不嚏者不可治之如嚏出膿血者治之必愈如左右看病之人日日用嚏藥嚏之必不傳染切須忌之其病人每

日用噦藥三五次以泄熱毒此治時毒之良法也經三四日不解者不可大下猶宜和解之服犀角散連翹散之類至七八日大小便通利頭面腫起高赤者可服托裏散黃耆散宜針鍼砭割出血泄其毒氣十日外不治自愈也此病若五日已前精神昏亂咽喉閉塞語聲不出頭面不腫食不知味者必死之候治之無功矣然而此疾有陰有陽有可汗有可下當見醫工但云熱毒只有寒藥殊不知病有微甚治有逆從不可不審矣

論諸瘡

夫諸瘡之生其類甚多種大小方書載之紛紛以要而論槩舉四等一者因於氣血稽留而結於內者謂腸胃之中癰疽是也二者因於氣血稽留而結於外者謂十丁九瘻五痔之類是也三者不因氣血而爲瘡謂惹什并金刀湯火炙烙而傷皮肉之類是也四者不因氣血而骨肉損傷者謂蟲獸爪牙所害之類是也然而四等皆不難損於肌膚害於筋骨不必見載今於隨方條下該說治證以法附之爲治之者臨疾制宜適事爲故耳

論丁瘡腫

夫丁瘡者以其瘡形如丁蓋之狀者是也古方論之凡有十種華元化載之五色丁千金方說丁瘡有十三種以至外臺必要神巧萬全其論頗同然皆不離於氣客於經絡五臟內蘊毒熱初生一頭凹腫痛青黃赤黑無復定色便令煩躁悶亂或增寒頭痛或嘔吐心逆以針刺瘡不痛無血是其候也其候本因甘肥過度不慎房酒以致邪毒嗑結遂生丁瘡內經曰膏粱之實足生丁瘡此之謂也其治之法急於艾炷灸之若不覺痛者針丁四邊皆令血出以廻瘡錠子從針孔紐之上用膏藥貼之仍服五香連翹湯漏蘆

湯等疎下之爲効若或針之不痛無血者以猛火燒錢針通赤於瘡上烙之令如焦炭取痛爲効亦維前鋌子用膏藥貼之經一二日膿潰根出服托裏湯散依常療之以取平復如針不痛其人眼黑或見火光者不可治也此邪毒之氣入臟腑故也養生方云人汗入食肉食之則生丁瘡不可不慎也

辯丁腫十三種形色禁忌

凡療丁腫皆刺瘡心至痛處又刺四邊十餘下令血出去血傳藥藥力得入針孔中則佳若不達裏藥力不到又看口中頰邊舌上有赤黑如珠子者是也瘡

上按之疼痛應心者是秋冬寒毒久結皮膚中變作此瘡不急療之日夜根長流入諸脉數道如箭入身顫掉不已若不慎口味房室死不旋踵經五六日不差眼中見火光心神昏昧口乾心煩嘔吐不定宜速治之

一曰麻子丁其狀肉起頭如黍米色稍黑四邊微赤多痒忌食麻子油衣布衣并入麻田中行

二曰石丁其狀皮肉相連色如黑豆甚硬刺之不入肉微痛忌瓦礫塼石之屬

三曰雄丁其狀皰頭黑靨四畔仰皰漿起有水出色

黃大如錢孔形高者忌房室

四曰雌丁其狀瘡稍黃向裏靨亦似灸瘡四面皰漿起心凹色赤如錢孔者忌房室

五曰火丁其狀如湯火燒灼瘡頭黑靨四邊有煙漿又如赤粟米者忌火燒烙

六曰爛丁其狀色稍黑有白班瘡中潰有膿水流出瘡形大小如匙面者忌沸熱食爛物

七曰三十六丁其狀頭黑浮起形如黑豆四畔起赤色今日生一明日生二及至十若滿三十六藥所不能治未滿三十六可治忌嗔怒畜積愁悵

八曰蛇眼丁其狀瘡頭黑皮浮生形如小豆狀似蛇眼大體硬忌惡眼人看并嫉妬人見忌毒藥

九曰蜃脣丁其狀大如匙面四邊皆赤有黑粟粒起食鹽大忌

十曰水洗丁其狀大如錢形如錢孔瘡頭白裏黑靨汁出中硬忌飲漿水水洗渡河

十一曰刀鐮丁其狀潤狹如薤葉大長一寸左側肉黑如燒烙忌刺及刀鐮切割鐵刀所傷可以藥治不可亂攻

十二曰浮漚丁其狀瘡體曲圓少許不合長而狹如

蕹葉大內黃外黑黑處刺之不痛黃處刺之痛
十三曰牛拘丁其狀肉色皰起搯不破
右十三種丁瘡初起瘡心先痒後痛先寒後熱熱定
則寒多四肢沉重心驚眼花若大重者則嘔逆嘔逆
者難治其麻子丁一種始末惟痒初錄忌者不得觸
犯觸犯者發作難治療其浮漚丁牛拘丁兩種無所
禁忌縱不療亦不能殺人其狀寒熱與諸丁不同皆
宜將護依法治療禁忌勿得觸犯若或觸犯春強瘡
痛極甚不可忍者是也又云丁腫初發時突起如丁
蓋故謂之丁令人惡心惡寒四肢強痛一二日瘡變

爲焦黑色腫大光起根硬刺之不覺痛皆其候也在手足頭面胷背骨節間最急其餘處則可毒入腹則煩悶恍惚似醉如此者三二日死矣皆不可不速治也

論瘰癧治法

夫瘰癧之病其名甚多巢氏病源載之三十六種千金聖惠所論瘰癧九漏總論說有風毒熱毒氣毒之異瘰癧結核寒熱之殊其本皆由恚怒氣逆憂思過甚風熱邪氣內搏於肝蓋怒傷肝肝主筋故令筋蓄結而腫其候多生於頸腋之間結聚成核初如豆粒

後若梅李核累累相連大小無定初覺增寒壯熱咽項強痛腫結不消者當便服五香連翹湯或牡礪大黃湯疎下三兩行於上貼十香膏烏犀膏及用淋瀝腫湯潰毒湯時復淋瀝如此救療即得消散若未消散可服內消丸或皂角丸之類漸以求差若腫結深硬荏苒月日不能內消者久必成膿若腫高而稍輭其人面色變黃皮膚壯熱上蒸膿已成也可以針決核中令其潰散則易愈也治法如瘡法于瘡口中用追毒蝕肉鉸子紐之於上用烏犀十香膏等貼之及托裏之劑和之經久不差或愈而復發或別處自穴

膿水透出流津不止肌體羸瘦者變成九瘻內經曰陽脉爲癰留連內腠卽此病也可用蒜餅子灸之然後瘡口上用紫金散翠霞散等於上紙貼膏藥永差其將護忌愼治療用法無造次焉

論痔瘻

夫痔瘻之候其名有五一曰牝痔二曰牡痔三曰氣痔四曰血痔五曰酒痔又曰腸風痔脉痔雌雄痔者五痔之別名也其狀初生悉在肛邊或如鼠乳或結小核痒痛注悶甚者身熱惡寒諸方論之皆由房酒過度久嗜甘肥不愼醉飽以合陰陽勞擾血脉腸癖

滲漏衝注下部肛邊生瘡變爲痔疾治法始覺痔作便服通氣丸槐角丸熱實者服諸利湯疎利臟腑及浴洗薰熨以取內消切忌酒麪辛熱房室肥膩稍縱嗜欲腐潰膿血或逗流搖汁歲月已深旁穿竅穴即變痔漏即須用寸金鋌子三五次痊愈若能味無味之味正味足矣事無事之事百事備矣其次服餌調節謹愼合宜未有不差者也

外科精義卷下

醫學博士選充御藥院外科太醫齊德之纂集

明　新安　後學　吳勉學校正

漏蘆湯

治一切惡瘡毒腫丹瘤瘰癧丁腫魚睛五發漂疽初覺一二日便如傷寒頭痛煩渴拘急惡寒肢體疼痛四肢沉重恍惚悶亂坐卧不寧皮膚壯熱大便祕澁小便赤黃並宜服之雖身莫服

漏蘆　白斂　黃芩去黑心

麻黃去節　枳實麩炒去穰　升麻

芍藥　甘草炙　矾硝已上各壹兩
大黃貳兩

右除硝外餘咬咀與硝同和勻每服三錢氣實人五錢水一盞半文武火煎七沸去柤空心熱服

化毒丹

治百種惡瘡毒腫初覺一二日咳逆煩悶或咽喉閉塞發熱惡寒

沒藥　乳香已上各伍錢另研　草烏頭醋浸炮裂
浮石已上各壹兩燒赤醋淬米次研　巴豆肆拾玖箇去皮生用另研

右五味爲細末用浮石烏頭餘醋打麵糊爲丸如

豌豆大每服五七丸食後冷酒送下忌熱飲取快利三二行或吐出惡爲効

內消丸

治瘡腫初生及瘰癧結核熱毒鬱滯服之內消矣大効

青皮　陳皮　已上各貳兩　牽牛　捌兩取頭末貳兩　薄荷葉　皂角　已上各捌兩不利者去粗皮搥碎二味水一斗煮令極軟揉汁去粗用熬成膏

右將青皮陳皮末并牽牛末和勻用前膏子和丸如菉豆大每服三十丸食後荊芥茶清溫水皆可下之

五利大黃湯

治人年四十已前氣血盛多患瘡疽大小便秘

大黃 根　黃芩 去腐　升麻 已上各貳兩

芒硝　梔子 已上各壹兩貳錢

右㕮咀每服五錢水一盞半煎五七沸去粗空心稍熱服

內消升麻湯

治證同前

大黃　升麻　當歸

黃芩 去腐　枳實 炒去穰　芍藥 已上各貳兩伍錢

甘草 炙壹兩伍錢

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至七分去滓食前稍熱服

五香連翹湯 如不用五香曰七味連翹湯

治證同前

沉香 藿香葉 木香

丁香 已上各壹兩 麝香 一字五味為粗末另研 連翹

射干 獨活 升麻

甘草炙 寄生草 已上各壹兩 大黃 壹兩伍錢

右七味㕮咀與前五味和勻每服五錢水一盞半

煎至一盞去柤温服取利爲効未利則再服食前

牡礪大黃湯

治證同前

牡礪　木香　大黃煨已上各等分

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至七分春夏露漏一宿於鷄鳴時空心服之冬月於暖處放一宿婦人重身者勿服此藥快利三兩行便勿服已上五方對證選用

和血通氣丸

治證同前

人參 壹兩　麥門冬 去心貳兩　大黃
黃芩 去核　黃蘗 已上各肆兩　牽牛 壹斤炒香取頭末肆兩

右六味爲細末煉蜜爲丸如豌豆大每服二三十丸食後溫水送下尋常積熱之人隔三二日服此藥微利潤動未不生瘡腫如已早覺者服之亦得內消矣

地黃煎丸

治臟腑有熱胃膈痰實血氣不和經絡秘澁多生瘡腫已患惡瘡毒腫大小便結澁

生地黃 新者拾兩洗水浸研如泥　黃連 伍兩

黃芩 去腐叁兩　枳殼 炒去穰　大黃 已上各貳兩伍錢
人參 貳兩

右除地黃煎外並爲細末再和地黃煎和搗入煉蜜丸如豌豆大每服五七十丸食後温水下素有熱之人日服百餘丸不發瘡瘍年高氣弱之人亦宜常服清利膈明目

槐角煎丸

治瘡瘍瘰癧疥癬赤腫等瘡

天麻　川芎　甘草 炙
黃藥子　甘菊花　人參 已上各壹兩

何首烏　苦參　已上各壹兩　荆芥穗
防風　已上各貳兩　槐角　并仁同放　伍錢

皂角　不蛀者已上各半兩水一斗煮軟搥汁去粗取仁
熬成膏子其皂角取肉研成膏子爲用者

右除皂角膏外槐仁與諸藥爲細末入膏內溲和
煉蜜爲丸如豌豆大每服五十丸食後竹葉湯下
皂角煎丸

治風毒瘙癮

皂角　不蛀者三十錠內十錠炮黑十錠酥　何首烏
炙十錠用水一斗煮軟搥汁用度　玄參　薄荷葉　已上各肆兩

右爲細末與前膏子同煉蜜爲丸如豌豆大每服

三四十丸食後溫水送下

苦參散 出野夫多効方

治遍身瘡疥經年不効

苦參　蔓荆子　何首烏

荆芥穗　蔵靈仙 已上各等分

右爲細末每服二錢食前酒調下日進二服忌發風物

苦參丸

治證同前

山梔子仁　苦參　防風

玄參　獨活　枳實
甘菊花　黃連去鬚　黃芩去心
大黃　已上各等分

右爲細末煉蜜爲丸如豌豆大每服五十丸茶酒任下食後服

肺風丸　全體治世方

治面鼻風瘡及皰齄

細辛　旋覆花　羌活　已上各壹兩一
晚蠶蛾去翅足　苦參　已上各貳兩

右爲細末輭飯和丸如梧桐子大每服五十丸茶

酒任下不拘時

連翹散

治瘡瘍癰腫一切惡瘡疼痛煩渴大便滯泄虛熱不寧

連翹　山梔子　甘草　防風　已上各等分

右爲麤末每服三錢水一盞煎至七分去柤温服不拘時候

竹葉黃芪湯　出總錄一百二十一

治諸癰疽發背煩渴及一切惡瘡發大渴者

淡竹葉貳兩　黃芪　當歸
川芎　甘草　黃芩去心
芍藥　人參　麥門冬去心
半夏湯洗　石膏已上各叁兩　生地黃搗兩

右爲麤末每服五錢水一盞半竹葉五片生薑五片煎至一盞去相溫服

枳殼丸出總錄

治瘡疽熱癰腫瘰癧

枳殼麩炒去穰　牽牛炒取頭末　木香
青皮已上各壹兩　甘草　大黃

右爲細末用皂角長一尺許者三錠約三兩炮焦搥碎以好酒煮轆掇取汁熬膏稠粘和前藥末爲丸如梧桐子大每服三五十丸食後葱茶下日進二服

五香湯 出總録

治諸瘡毒氣入腹托裏

丁香　木香　沉香　乳香 已上各壹兩　麝香 參錢嗢者去麝香加　藿香 湯加　人參 已上各壹兩

右爲細末每服三錢水一盞煎至六分去粗空心

稍熱服總録聖惠千金外臺治諸瘡腫方中皆載此方大同小異大抵專治毒氣入腹煩悶氣不通者其餘熱渴昏昧口燥喘乾大便硬小便澁者未可與服

托裏黃芪湯 出總録

治諸瘡潰後膿多內虛

茯苓 去皮　人參　官桂 去肉

遠志 去心　麥門冬 去心　五味子 炮

黃芪　當歸 已上各等分

右爲麤末每服五錢水一盞半煎至一盞去柤温

服食前

托裏茯苓湯

防風　桔梗　芍藥

五味子　川芎　甘草

麥門冬去心　桂去皮　熟地黃已上各壹兩　茯苓已上各壹兩伍錢

當歸　黃芪

右爲末每服五錢水一盞半煎至一盞去柤温服

托裏當歸湯太醫瘡科何君玉方

當歸　黃芪　人參

熟地黃　川芎　芍藥

甘草炙　柴胡已上各等分

右爲麤末每服五錢水一盞煎至六分去柤食前温服

托裏散 出太醫瘡科成子王方

川烏頭炮　茯苓已上各叁兩　乾薑炮

麻黄去節　甘草炙兩伍錢已上各壹　杏仁炒去皮尖

五味子　桂心已上各壹兩

右爲麤末每服五六錢水一盞半煎至一盞去柤食前温服

托裏玄參散 出總録

主托裏止渴解熱煩渴

玄參　人參　甘草炙

甘菊花　已上各等分

右爲細末每服二錢菉豆湯調下亦名內托散

內托散　洪氏方有芍藥總録無芍藥亦名生肉芎藭散

治癰疽潰後內虛者或氣弱人初覺生瘡湯亦可服內消宜詳細用之

當歸　芎藭　黃芪

厚朴　去皮　桔梗　防風

甘草　炒　官桂　人參

白芷　芍藥　已上各壹兩

右爲細末每服三錢温酒調下或木香湯亦可

內補散　聖惠六十一總録一百二十八無川芎

黃芪　麥門冬去心　川芎

當歸　茯苓去皮　人參

五味子已上各壹兩　遠志去心　甘草炙

桂心已上各伍錢

右㕮咀每服五錢水一盞半生薑三片棗三枚煎八分温服無時

內塞散　總惠一百二十三萬全方中去附子用天雄

治疳瘦不差諸瘡

附子 貳箇炮　官桂 去皮　赤小豆

甘草 炙　黃芪　當歸

茯苓　防風　白芷

桔梗　川芎　人參

遠志 去心　厚朴 已上各壹兩

右爲末每服二錢溫酒調下空心日進一服

香粉散

主托裏止痛解煩渴退虛熱

真菉豆粉 叁兩　南乳香 壹兩

右爲細末每服三錢新水調下

止痛當歸湯 出總錄一百三十

治腦疽發背穿潰疼痛

當歸　黃芪　人參

官桂　芍藥　甘草炙

生地黃 已上各壹兩

右爲麤末每服五錢水一盞半煎至一盞去粗溫服日進三服

黃芪茯苓湯 出總錄一百三十

治諸瘡潰後托裏除虛熱

黃芪　白茯苓　官桂去皮
麥門冬　五味子　川芎　已上各壹兩

右爲麤末每服五錢生薑三片棗一枚水一盞半煎至一盞去粗溫服食前日進三服

內補防風散

附子貳箇炮裂去皮臍　防風　茯苓
白芷　桔梗　川芎
當歸　人參　甘草炙
遠志　官桂去皮　黃芪　已上各壹兩
厚朴貳兩生薑汁製　赤小豆半升酒浸一宿

右爲細末每服三錢溫酒調服

伏梁丸 出養生必用方

治環臍腫痛腸胃瘡疽

厚朴 生薑汁製炙　茯苓　枳殼 麩炒去穰

白朮　荆三稜 炮　半夏 湯洗七次

人參 已上各壹兩

右爲細末麵糊爲丸如小豆大每服三十丸食前米飲湯下

温經丸 出前方

治暗脉癆

厚朴　官桂去皮　白朮
甘草　乾薑炮　木香已上各壹兩
附子貳兩醋浸炮淬七次去皮臍

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食後飲湯下

木香湯腫湯
治諸瘡疽始發腫脈增長熱痛

木香　犀角　大黃
梔子仁　升麻　黃芩
黃連　射干　黃蘗

白歛　甘草炙　升硝

紫檀　羚羊角　已上各壹兩

右㕮咀入生地黃汁五合如無只用生乾地黃五兩剉碎和勻每用藥五兩水一斗煎至七升入麝香五錢淨帛醮藥熱搨腫上日兩三度冷卽再換

升麻湯腫湯

升麻　黃芪　防風

川芎　生地黃　細辛　已上各等分

右㕮咀用藥二兩水二升煎十沸稍熱淋湯內消如神

瀉腫升麻湯出總録淋瀉條下

升麻　芒硝　黄芩

漏蘆　梔子仁　蒴藋

右㕮咀每用藥二兩水三升煎十沸帛蘸藥瀉潰腫處

猪蹄湯出聖惠方

升麻　甘草　芍藥

蒴藋已上各等分

右㕮咀每用藥四兩水一斗猪蹄一對煮蹄輭取出次下藥再煎十沸帛蘸淋瀉之

甘草大豆湯 出聖惠方

治外陰蝕下疳瘡瘡腫痛

甘草 叁兩　赤皮葱 叁莖　大豆 壹合

右用水三升煮豆熟爲度用槐條一握同煮取清汁熱淋浴冷卽再温浸三二時爲度大効

溻腫湯

芍藥　丹參　黃芩 去黑心

白斂 已上各等分

右㕮咀用藥五錢水一升煎十沸帛蘸頻溻之

洗毒湯

苦參　防風　甘草炙
露蜂房 已上各等分　白芷

右㕮咀水煎濃汁洗瘡腫

浴毒湯 出拾遺衛生方

治小腸風陰瘡痒痛

木通　藁本　枳殼
管仲　白芷　荆芥
甘松　薄荷 已上各等分

右㕮咀用藥二兩水五升入芒硝半兩煎至三升熱洗浴瘡

何首烏散 出秘寶生方

治遍身瘡腫痒痛

防風　苦參　何首烏

薄荷 已上各等分

右爲麤末每用藥半兩水酒各一半共用一斗六升煎十沸熱洗便於避風處睡一覺其痛甚者三日痊愈

八仙散 出衛生方

治遊風腫痒疥癬瘡或因洗頭遊風瘙痒生瘡

細辛　荆芥　白芷

川芎　黃芩　防風
甘草　地骨皮　已上各等分

右爲麤麤末每用藥二兩水二碗煎十沸去柤熱淋湯患處

消毒湯

治百雜瘡腫悉能內消

獨活　防風　細辛
藁本　川芎　枸杞子
荆芥　漏蘆　大黃
黃芩　去腐　官桂　苦參

蕨靈仙　丹參　黃芪
當歸　芍藥　茯苓
黃連　無心草　黃蘗
麻黃　葛根　蒴藋
菊花　杜仲　地骨皮
秦皮　蒺草　甘草
甘松　藿香　白芷
露蜂房　升麻　零陵香　已上各壹兩
蒼朮　參兩　石硝　伍兩　菖蒲　捌兩

右爲麤末每用藥半兩水二升葱三莖槐柳枝各

一握同煎十餘沸去柤熱淋洗浴此藥用之如神熨風散 出王子中箱集

羌活　防風　白芷
當歸　芍藥　細辛
芫花　吳茱萸　官桂 已上各等分

右爲麤末作二劑赤皮葱連鬚細切半斤同釀醋拌勻炒令極熱帛裹於瘡上熨之稍冷卽換藥熨之上下痛止而已

應痛丸

治走注疼痛疑是附骨疽者

蒼朮 去皮　當歸　草烏頭 炮
黑牽牛 已上各壹兩

右爲細末用醋糊爲丸如小豆大每服二十丸空心醋湯送下

黃芪丸

治腎臟風虛攻注手足頭面麻痺痛痒或生疥癬腫瘃

黃芪　烏藥　茴香 炒
地龍 去土　川椒 去目　防風
川練子 炒　赤小豆　白蒺藜 去刺

海桐皮　蔵靈仙　陳皮　已上各等分

右爲細末酒糊爲丸梧桐子大每服三十丸空心溫酒送下

梔子仁湯　出普濟生靈方

治時氣頭面赤腫

鬱金　枳殼去穰　升麻

梔子仁　牛蒡子　大黃　已上各壹兩

右爲細末每服三錢蜜水調下

葛根牛蒡子湯

治時毒大頭病是也

葛根　管仲　甘草
鹽豉　牛蒡子　已上各壹兩

右爲細末每服三錢用水調下此疾近代患者傳染多致夭枉治之者少得方法只云太熱必然殊不知亦有虛實表裏治之者詳其汗下吐不同大抵與傷寒頗類其中亦有可針鑱砭射出血者亦有久而敗爛出膿者其間變異百端不可不慎所宜時疾也

通氣散

治時氣頭面赤腫或咽喉閉塞不通用之取嚏噴

七八遍洩出其毒則差若看病之人用此藥必不傳染

玄胡壹兩伍錢　豬牙皂角　川芎已上各壹兩
藜蘆伍錢　鼯鼠花貳錢伍分

右爲細末每用紙撚子蘸一米許紲於鼻中取嚏爲効

白丁香散

治婦人吹奶初覺身熱頭痛寒熱及胷乳腫硬是其候也服之能令下其乳汁通其血脉立能自消矣

白丁香 直者

右爲細末每服二錢酒調服腫硬立消甚者不過三服

金銀花散

治發背惡瘡托裏止痛排膿

金銀花 肆兩無花用苗葉嫩莖代之 甘草 壹兩

右爲麤末分爲三服酒水各一盞同煎至一盞去相温服無時

皂蛉散

治婦人因露風邪氣外客於乳内始爲吹奶積久

不消以爲妙灑此藥導其汁散其風邪汗出其病自然痊愈矣

皂角（不蛀者燒存性）　真蛤粉　已上各等分

右爲細末每服二錢温酒調下不拘時候

十香膏

治五發惡瘡結核瘰癧疽癰疔瘡

沉香　麝香　已上各一錢　木香　丁香　乳香　甘松　白芷　安息香　藿香　零陵香（各伍錢同爲細末）　當歸　川芎

黃芪　木通　芍藥
細辛　升麻　白斂
獨活　川椒　藁本
菖蒲　厚朴　木鱉子
官桂　商陸根 各貳兩剉碎　桃仁
杏仁　栢子仁　松子仁 各五錢
槐枝　桑枝　柳枝
松枝 各貳兩剉　沒藥　輕粉
雄黃　硃砂　雲母石
生犀角　亂髮灰　白礬灰 各二兩另研如粉

真酥　猪脂　羊腎脂　各貳兩

黃丹　壹斤　清芝麻油　三斤

右先於木炭火煉油香熟下一十六味剉碎藥并四枝四仁熬至紫黑色出火濾去粗入脂酥煎十餘沸再以新綿濾過油澄清拭鐺令淨再入火上煎油沸下丹用濕桺枝作箪子不住攪熬一日滴在水中成珠不散則成也離火入十味藥末攪勻再上火入雲母等粉八味輕煎令沸出火不住攪一食時於磁盒内密封收每用量瘡口大小緋帛上攤貼之腸胃癰疽可作丸梧桐子大每服七九

空心温酒送下

犀角膏

當歸　川芎　黄芪

白芷　白歛　杏仁

木鱉子　官桂　乳香

没藥 已上各壹兩　亂髮灰 伍錢　黄丹

清油 伍斤

右前八味細剉於油内先浸一宿於木炭火上熬至白芷杏仁焦濾去粗滓清再煎油沸下丹以濕柳木箪子不住攪旋滴藥在水中如珠不散出火

候一時辰下乳香没藥并髮灰攪勻於磁盒内收依常法攤用之

乳香膏

治一切惡瘡打撲走注疼痛

乳香研　珠子灑青　白蠟已上各伍錢

白膠香貳兩　杏仁油壹斤

右將灑青於木炭火上先溶開下白膠香黃蠟化開入油攪勻以綿濾去滓於井花水中持拔白色如銀再溶入乳香在内拔白色收磁盒内依常法攤用之

白龍膏

治頭面五發惡瘡及燒湯凍破潰爛止痛生肌清血脉消毒敗腫通氣脉如神至可無瘢痕

輕粉 伍錢另研　白薇　白芷

白斂　黃芪　商陸根

柳白皮　桑白皮 已上各壹兩　乳香 貳兩另研

定粉 另研　黃蠟 已上各捌兩　杏子油 一斤加無用芝麻油

右七味剉油內揉浸三日於木炭火上煎令白芷黃色濾去相於油中下黃蠟乳香後溶開出火再濾候微冷下輕粉定粉急攪至冷磁盒內收貯每

用緋絹上攤用之

消毒膏

當歸　黃芪　川芎

杏仁　白芷　白斂

零陵香　梔白皮　柳枝嫩者

木鱉子用仁　甘松已上各伍錢剉　乳香

沒藥已上各三錢　輕粉一錢　硃砂

朱紅已上各伍分　麝香一分　黃丹炒紫色

黃蠟已上各捌兩　芝麻油壹斤

右將剉藥油浸七日木炭火上煎杏仁焦色濾去

柤下黃蠟候溶開出火下丹急攪百十轉下乳香
麝香硃砂等六味不住手攪至凝磁盒內收貯白
光絹上攤之治證如白龍膏之類貼面目毛髮最
宜用之

磨風膏

治頭面五發瘡腫疥癬等疾及湯火破傷磨風止
痛滅瘢痕

白附子　白芍藥　白茯苓
零陵香　白芨　白斂
白芷　白檀　藿香

升麻　細辛　黃芪
甘草　杏仁 去皮尖已上各伍錢　腦子 壹分
括蔞根 壹兩　大括蔞 貳兩去皮　黃蠟 陸兩
芝麻油 壹斤

右先藥十四味剉油內浸百日於臘日慢木炭火上銀石器內煎至白芷微黃色離火入括蔞二味著內煮百沸重綿濾去柤再慢火上煉油香下削淨黃蠟溶開爲度傾在磁器內收貯上糝腦子密封旋用磨風塗之

天麻膏

治疥癬赤禿手足癬皮剥起瘡疥疳侵蝕痛膿汁浸淫滋蔓經久不差者

草烏頭　釣苓根　木鼈子
天麻　藜蘆　川芎
狼毒 已上各伍錢　輕粉　粉霜 已上各貳分另研
臘猪脂 貳兩　黄蠟 陸兩　油 壹斤

右前七味細剉如麻豆大於油內煎至焦紫色令冷濾去粗上火入黄蠟猪脂溶開再用重綿濾過入輕粉粉霜攪凝磁盒內收貯用以塗摩之大効善應膏 出南京寶光院明昌六年聞進方

當歸　白芨　官桂
白斂　白芷　杏仁 去皮尖
木鱉子仁 已上各壹兩剉碎　乳香
沒藥 已上各五錢研　黃丹 貳斤　芝麻油 伍斤

右先將油煎剉藥令白芷焦黃濾去柤再煎油沸下丹用濕桃箬子不住手攪滴在水中成珠子住火入乳香沒藥攪勻以磁盒內收貯依常法用之

靈應膏 出總錄

治五發惡瘡瘰癧結核乳癰

白麥飯石 燒醋淬七次　白斂 已上各伍兩

鹿角 拾兩燒存性

右爲細末每用醯醋中熬如膏厚塗於上中心留一竅以出其毒以故舊輭布攤之貼未成膿者貼即自消已成膿者便潰惡肉疾出新肉早生効不必具陳用之如神

翠玉膏

治輭瘤膿水逗流愈後復發

明瀝青 肆兩　銅碌 二兩　芝麻油 三錢

猣猪膽 二箇

右先於炭火上溶開瀝青入油令沸下膽汁攪勻

入水中用手搏搦磁盒內收貯用於緋光絹上量瘡大小攤貼之不須再換一上便痊可自落爲度

追毒散　太醫成子王方

治一切惡瘡膿水不快者

五靈脂　川烏頭炮　白乾薑炮已上各一兩　全蠍五錢

右爲細末用少許糝瘡口中深者紙撚蘸藥紝於瘡口內以膏貼之或浸蒸餅令浸透搦去水和藥合勻撚作錠子每用紝入瘡口中亦名追毒錠子

迴瘡錠子　治疔瘡大效

草烏頭一兩　蟾酥七錢　巴豆七分去皮　麝香一字

右爲細末麵糊和搽作錠子如有惡瘡透丁不痛無血者用針深刺到痛處有血用此錠子紲之上用膏貼之丁瘡四畔紲之其丁三二日自然拔出此藥最當緊用

射膿丸　治諸瘡癰膿水已成即當針開洪出陳臭惡瘀則其活也若其惡瘀不出欲鍼呂須當開發用此藥以射出其膿也

白礬灰一錢　砒霜五分　黃丹一字

右爲末麵糊爲丸搽作錠子每用粘瘡頭欲出處以膏貼之自潰

替鍼丸　出保生信効方

治證同前

陳壞米末一錢　硇砂伍分　雄雀糞百者二十粒

右爲細末粳米粥丸如粳米樣每用一丸粘在瘡頭上以膏貼之

治瘰癧并馬老鼠瘡

銅碌　班猫　砒霜　已上各伍分

右爲細末醋糊爲丸如鼠糞大每用時一錠子作三丸納於瘡口上以膏貼之如無瘡口乾糝之妙

翠霞散

治百雜惡瘡去毒生肌

滑石　一兩　銅碌　伍錢　輕粉　二錢

片腦　麝香　已上各三分　粉霜　一字

右爲細末每醯藥紙於瘡口上以膏貼之或滑石二兩名二聖散量其淺深輕重用之

搜膿散

治年深不効惡瘡

白芷一兩　芎藭貳兩　白芍藥叁兩

輕粉三錢

右爲細末每用乾糝瘡口上瘡口深者紙之

引膿散

治證同前

狼毒　釣苓根　無心草根

白丁香 已上各五錢　麝香一字

右爲細末如前法用治之

乳香散

治證同前

白乾薑　苦丁香　草烏頭 已上各五錢

釣苓根　狼毒　乳香 已上各一兩

右爲細末每用乾糝之或唾調作旋子紉入瘡內

釣苓散 陳宮贊方

治證同前

井鹽一兩　無心草　乾薑 已上各二兩

釣苓根 三兩

右為細末每用乾糝之或唾調少許塗在膏上就貼之

截疳散

治年深疳瘻瘡大効

蜜陀僧 白斂 白芨

黃丹 已上各一兩 黃連 伍錢 輕粉一錢

腦子 麝香 已上各伍分

右前四味為細末後四味另研極細和勻為散每用或糝或紙瘡口中以膏貼之

抵聖散

治耳中膿經年不愈及驢涎馬汗攻瘡瘍骨疽疳瘻等瘡

白礬灰一兩　烏魚骨三錢　乳香貳錢

乾胭脂　輕粉已上各一錢　麝香五分

右爲細末或糝或紙以膏貼之如有耳膿者用一字紙耳中

青金錠子

治諸惡瘡膿出不快者及多年疳瘻瘡愈而復發

白丁香　銅青　硇砂

粉霜　輕粉 已上各伍分　麝香
龍腦 已上各壹字

右爲細末麵糊爲丸撚作錠子每用紙入瘡口中膿水出快

白龍散

主生肌止痛及耳中卒然大痛

寒水石 四兩燒半白研　烏賊魚骨 研　滑石 已上各壹兩 研
鵬砂 叁錢　輕粉 壹錢

右爲細末每用乾糝耳中痛者油調如糊滴紙於耳中痛立止

桃紅散

主斂瘡生肌肉定血辟風邪

滑石 四兩　寒水石 燒貳兩　小豆粉 壹兩

乳香　輕粉 已上各壹錢

右爲細末每用乾糝血不止者和燈草貼瘡口上以帛封之

檳榔散

治久患惡瘡肌肉遲生

木香　黃連　檳榔 已上各等分

右爲細末每用乾糝之

金黃散 出九籥衛生方

主消腫散毒生肌止痛

黃連　大黃　黃芪

黃芩　黃檗　鬱金　已上各壹兩

甘草 伍錢　龍腦 伍分另研

右爲細末入龍腦研勻若治濕毒丹腫新水調掃赤上或蜜水調如稀糊用小紙花子貼之或小油調掃如久不差熟瘡毒赤乾糝或水調塗亦佳

生肌散

主斂瘡大効

寒水石 燒　滑石 已上各貳兩　龍骨
烏魚骨 已上各壹兩　蜜陀僧　枯白礬
乾胭脂　定粉 已上各伍錢

右為細末用藥乾糝瘡口上

水澄膏

治熱毒腫痛大効

大黃　黃蘗　鬱金
天南星　白芨　矾硝
黃蜀葵花 已上各壹兩

右為細末每用新水一盞半藥末二錢攪調勻候

澄底者去浮水以紙花子攤於腫瘍處貼之如急燥津唾潤之此藥治熱毒赤腫神効如皮膚白色者勿用之

拔毒散

治熱毒丹腫遊走不定

寒水石 生用 石膏 生用已上各肆兩 黃蘗 甘草 已上各壹兩

右爲細末每用新水調掃之或油調塗之或紙花子小貼亦妙涼水潤之

金露散 出普濟本事方

治時氣熱毒

寒水石 生用壹兩 伍錢　黃蘗 壹兩　白芨

白斂　雄黃 已上各貳錢伍分

右爲細末無根水調以紙花子貼或掃亦妙

消毒散

治諸惡瘡生肌止痛消毒散腫

滑石 壹斤　黃蘗 貳兩　黃丹 壹兩

乳香 伍錢　輕粉 叁錢

右爲細末每用乾糝或燒湯及下注臊瘡風濕疥癬等瘡油調塗之

大檳榔散 成子玉方

治乾濕疥癬

硫黃　黑狗脊 已上各伍錢　輕粉 壹錢

紅娘子　大檳榔 已上各壹箇

右爲細末每用藥末半錢於手掌中臨卧時油調如糊兩手搓摩極熱鼻內聞之及摩擦疥上隔日再用甚者不過三上必驗

天麻散

治白禿癩瘡及風毒疥癬

蔥蘆　天麻　狼毒

白芷　　菌草　　釣苓根
草烏頭　　管仲　　細辛　已上各伍錢
雄黃　貳錢　　輕粉　壹錢

右爲細末每用藥半兩紙一重綿裹油三兩浸三日外蘸拈擦患處如稍乾添油一兩添至三兩換藥其効如神

決効散

治風痒頭瘡

管仲　叁兩　　白芷　壹兩

右爲細末油調塗之

水銀膏

治瘍瘡疥癬無名惡瘡但是手足瘡疥浸淫多汁久而虫生塗之神効

蕳茹 剉　黃蠟 已上各壹兩　黃連 剉

蛇牀 微炒　白礬枯　水銀 已上各貳兩

右用臘猪脂七兩熬開下三件剉藥煮至焦紫色去粗再入黃蠟溶開出火稍凝下水銀礬石攪至勻每用塗摩

平肌散

治諸瘡久不斂者

窯陀僧　花蕊石三味同煅赤色　白龍骨已上各壹兩
黃丹　乳香　黃連已上各貳錢伍分
輕粉壹錢

右為細末入乳香輕粉黃丹同研令勻每用乾糝

神黃散

治一切熱腫攻熾疼痛

黃蘗末壹兩　黃丹貳兩炒紫色　雄黃壹兩另研

右同研勻每用新水調如糊敷掃以小紙花貼稍乾以蜜水潤之

博金散

治下疳蝕臭爛腫痛

白礬 與蜜陀僧同爲末相和於沙鍋內火上炮汁盡 蜜陀僧 已上各伍錢

白堊 貳錢 黃丹 輕粉 已上各壹錢

乳香 伍分 麝香 壹字

右爲細末先須另用槐枝葱白鹽甘草熬湯淋湯洗一二時淹乾糝上項藥每用藥先須洗浴然後糝藥甚者三五次差

金傷散

治刀鎌斧傷癖風止痛生肌

白芨 叁兩 陳石灰 風化 桑白皮

黃丹 已上各貳兩　白附子　天南星
龍骨 已上各壹兩

右爲細末每用乾貼之

完肌散

治證同前

蛮陀僧　桑白皮 新者　龍骨 已上各肆兩
陳石灰 貳兩　黃丹 伍錢　麝香 壹錢另研

右爲細末乾糝之

定血散

治證同前

黃丹 壹兩　烏魚骨
白礬灰
龍骨 已上各貳兩　蜜陀僧 半斤　桑白皮 壹斤

右爲細末每用乾糝定血如神

碧霞錠子 太醫陳官寶方

治惡瘡透不覺疼痛

銅綠 壹兩　硇砂 貳錢　蟾酥 壹錢

右爲細末輭米飯一處擦勻捻作錠子粳米樣每用針刺之不覺痛者但有血出紐一錠子在內以膏貼之或作散以紙撚蘸紙之亦可臨證看如何宜合用度

漏蘆湯

治婦人吹奶初覺

漏蘆　練實　大黃
黃芩　芍藥　甘草　已上各伍錢

右爲麤末每用三錢水一盞半燈草三十莖同煎至一盞去柤溫服無時

玉粉散　出蘇沈良方

治陰瘡浸淫不止

白礬灰　定粉　已上各等分

右研細末先洗浴淨淹乾敷糝之

香礬散

治小兒斷臍之後不乾及膿出耳中

枯礬 伍錢　龍骨　黃丹 已上各壹錢

麝香 少許研

右爲細末每用乾糝之

紫金散

治瘰癧久不差者

枯礬 伍錢　硇霜 壹錢　石膽 伍分

右爲細末入黃丹二錢每用綫入瘡口內以膏貼之如未破者灸一兩壯用津唾旋調一豆許安瘡

上以膏貼之去根自平復

通耳丹　盧全寶傳

治耳聾

桑螵蛸　安息香　阿魏　已上各壹錢伍分

硃砂伍分　蕳麻子仁　大蒜

芭豆仁　已上各柒箇

右爲細末入二仁與蒜同研爛爲丸如棗核樣每用一丸綿裹內耳中如覺微痛卽取出親驗方

菖蒲錠子　一名菖蒲散

治耳中卒痛

菖蒲　附子　炮去皮臍已上各貳兩

右爲細末每用油調滴耳內立効

寸金錠子　太醫陳子寶方

治療痔疾

藤黃　雄黃　雌黃

硫黃　輕粉　粉霜

麝香　硇霜　黃丹　已上各壹錢

牡礪粉　紅藤根　乾漆　已上各伍錢

右爲細末研勻燒陳米飯和搗爲丸如棗核大每用一丸內肛門中深二寸許放令定用新磚毬子

二箇炭火燒赤醸醋中蘸過綿裹一箇於肛門上熨之冷即換上下次之來日大便下臭敗惡物除根也

薰痔散

威靈仙 叁兩

右用水一斗半煎至七八沸去火就盆上坐令氣薰之候通手淋湯冷即再暖

通靈丸

治耳聾

松脂 伍錢　巴豆 貳拾肆箇去皮研

右先將松脂溶開入巴豆末熬成膏丸如白豆大綿裹一丸塞耳中覺痛取出赤水爲効

三神丸

治僧道痔疾因讀養生必効方見乾義傳僧覺海少年患痔疾其行業比氷霜緣此飽食久坐知痔疾者不必酒色過度矣故素問云因而飽食筋脉橫解腸澼爲痔治之故不同也

枳殼 炒去穰 皂角 燒存性 五倍子 已上各等分

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三二十丸溫水食前服養生必効方中三味皆單方一味爲

方今增爲一方其効如神

玉芝飲子

治膈熱口舌生瘡咽喉腫痛

甘草 炙貳兩　藿香葉　石膏 水飛

山梔子仁 已上各壹兩

右爲細末每用一錢新水調下

平和飲子 出聖惠經中

治小兒瘡疹

人參　白朮　茯苓

甘草　升麻 已上各等分

右爲細末每服一二錢水煎去滓温細細飲之量歲大小虛實以意詳之此藥治諸瘡疼煩渴不寧者皆可服之惟小兒瘡疹尤佳

玄參丸 出僧居泰傳

治口瘡連年不愈者

天門冬去心 麥門冬去心 玄參 已上各等分

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸嚼化

犀角散

治口舌生瘡咽喉腫痛熱毒時氣

升麻 桔梗 甘草炙 已上各壹兩

牛蒡子 炒肆兩

右爲細末每服三錢水一盞入竹葉五七片煎至七分去柤細細熱嗽温卽嚥之其柤熱掃項腫上

防風散

治破傷瘡瘍風邪或身體疼痛風邪攻注攣急及皮膚瘙痒麻木不仁頭昏悶牙關緊欲成破傷風

防風 壹兩　蔓本　羌活

地骨皮　荆芥穗 已上各伍錢

右爲細末每服三錢温酒調下

烏金散

治疳瘡惡瘡

麝香　蟾酥已上各壹字　粉霜

硇砂　輕粉已上各壹錢　銅緑

砒霜　白乾薑　草烏頭

天南星　艾上硫黃已上各伍錢

右爲細末紙撚紉之或湯浸蒸餅和爲錠子紉瘡口內上以膏貼之

劉守真瘡論

素問云痛痒瘡瘍癰腫疽疹瘤氣結核拂鬱甚者皆熱五臟不和九竅不通六腑不和留結爲癰近於火

氣微熱則痒熱甚則痛附近則灼而爲瘡皆火之用也人之瘡腫因內熱外虛所生也爲風濕之所乘則生瘡腫然肺主氣候於皮毛脾主肌肉氣虛則膚腠開爲風濕所乘脾氣濕而內熱卽生瘡也腫者由寒熱毒氣客於經絡使血澁而不通壅結成腫風邪不作卽無頭無根寒血相搏作者卽有頭有根壅盛則爲膿赤根腫則風氣流潰也瘡以痛痒痛則爲實痒則爲虛非虛爲寒也正謂熱之微甚也痒則美疾也故火旺於夏而萬物蕃鮮榮美也灸之以火潰之以湯而其痒轉甚者微熱之

所使也痒去者謂熱令皮膚縱緩腠理開通陽氣得泄熱散而去或夏熱皮膚痒而以冷水沃之其痒不去謂寒能收斂腠理閉密陽氣鬱結不能散越怫熱內作故也瘡瘍皆爲火熱而反腐出膿水者猶穀肉果菜熱極則腐爛而潰爲汚水也潰而腐爛者水之化也癰淺而大疽深而惡熱勝血則爲癰膿也瘍有頭小瘡也疹浮而小癮疹也瘡氣赤瘡丹熛熱勝氣火之色也

沒藥膏

治一切癰疽發背瘡癤傷折蹉跌壞膿生肌止痛

又貼炙瘡極妙

麒麟竭　明乳香　沒藥　已上各壹分研

當歸去蘆　木鼈子仁研　杏仁已上各伍錢

油頭髮貳兩　黃丹陸兩

右先用油一斤石器內或沙鍋內露天底鍊油令熟先下木鼈子當歸杏仁頭髮慢火熬黃焦油耗五分離火用綿濾柤不用再入鍋下黃丹以新柳篦子十條旋換攪不住手候黑色滴在水中成珠子硬輭得所取下火入三味研藥再攪勻磁盒內盛放地上以盆合一宿出火毒用時或帛上或紙

上攤一日一換

必効散

治久患瘰癧不効服此藥取効如神

南鵬砂 貳錢伍分　輕粉 壹錢　麝香 伍分

班猫 肆拾箇去頭翅　巴豆 伍箇去皮心膜　白檳榔 壹箇

右同研極細取雞子清二箇去黃調藥勻却傾在雞子殼內濕紙數重糊定無令透氣坐飯甑內與飯一處蒸飯熟取藥曝乾研極細末用時相度虛實虛人每服半錢實人每服一錢並用炒生薑酒下五更初服藥至平明取下惡物如覺小腹內疼

痛便用緜麻子燒灰入沒藥等分同研細用茶調下一錢便入大腸其取下惡物如爛肉老鼠兒及新成卵肉雀兒是藥之効婦人有胎不可服

烏金散

治癮癗腫硬無頭不變色者

末粉 肆兩　葱白 壹兩細切

右同炒黑色杵爲細末每用看多少醋調攤紙上貼病處一伏時換一次以消爲度

抵聖丸

治男子婦人頭面手足虛腫

苦葶藶 不以多少於火上隔紙炒過

右杵爲細末棗肉爲丸如小豆大每服十丸煎麻子湯下食前日進二服五七日小便多腫消爲効如喘嗽煎桑白皮湯下忌生冷酢滑物及鹽須另丸一等小丸兒與小兒服看大小加減與服煎棗肉湯下

應効散

治氣瘦痃癖多年不効者

地骨皮 不以多少冬月自取只要皮陰乾

右杵爲細末每用紙撚蘸紝瘡口內頻用自然生

肉更用米飲調二錢無時日進三服又名托裏散

白金散

治風攻注毒遍身及手足生熱瘡疼痛有黃水出

桂府滑石

右爲細末先用虎杖甘草豌豆各等分約半兩許二椀水煎上項三味至一椀去粗微熱淋洗瘡水冷拭乾上糝滑石末令通便睡至明決愈

如聖散

治渾身瘙痒抓之成瘡及癮疹之類

鹽沙壹升

右用水二斗煎至一斗濾去粗夜卧避風處淋洗水冷即拭乾便睡

大蛾散

治刀斧傷止血定痛生肌

晚蠶蛾 不以多少

右爲細末每用藥貼於瘡口上用綿裹不須再動一上便可

必効散

治蜘蛛咬著疼痛

鹽豉 炒乾

右爲細末每用油調塗之必効

蛤粉散

治湯火燒湯瘡

蛤礪 燒赤放冷

右研如粉每用油調塗之日三次

治小兒丹瘤

木鼈子 新者去殼

右研如泥淡醋調傅之一日三五次便効

治小兒疳口瘡

天南星 壹箇去皮

右爲末好醋調攤在紙上男左女右貼在脚心底以帛繫定三日外取了以温水洗盡脚下藥

治破傷風 并洗頭風藥

麻黃 壹錢去節　蝎稍 貳錢伍分　蠮螉

草烏頭　黑附子 炮去皮　白附子

天麻　烏稍蛇 好酒浸二夜去骨火上炙黃色

川芎 已上各伍錢

右爲細末每服一錢熱酒調下日進三五服重者三五日必効此證只宜早治但邪氣入臟則難治治有四死證不可治一頭面青黑色二額上有汗

珠不流三眼小目瞪四身上有汗出如油

烏龍丸

治遍身風瘡瘙痒疥癬等疾服之消風散熱利膈化痰唾治肺氣不和此藥推陳致新去腸垢治證甚多要能用度

皂角肥者不以多少炙刮去皮弦搥碎甜水揉取濃汁去粗銀石器內熬成膏另放之

黑牽牛不以多少微炒令香熟濾取頭末

右將藥末與皂角膏和丸如梧桐子大每服三五十丸氣虛者一二十丸食後溫水送下無病氣實人一兩箇月頓一服取利三五行不傷正氣身體

輕健肌膚光澤永無風疥疥癬之疾

紫參丸

治熱毒瘰癧腫毒未成者內消已潰者行膿止痛散腫毒

麝香另研　膩粉已上各壹錢　紫參

苦參炒已上各壹兩　丹參壹兩伍錢　連翹貳兩

滑石貳兩伍錢

右爲末別用玄參一斤搗碎以酒三椀浸三日揉取汁去粗用皂角子三百箇煨熟爲末用玄參酒熬皂角子末成膏和前藥丸如梧桐子大每服一

丸以黃芪湯下一日加一丸至患人歲數即住如四十則二十每日減一丸其瘡自乾已結者內消也服此藥大有神効

萬靈丸

治腦背疽并一切惡瘡初覺一二日

硃砂　血竭　蓮蕊已上各等分　麝香少許

右爲細末酒糊爲丸如黃米大每服七丸溫酒送下瘡在上食後在下食前不過二服即効

治眼

治昏澀退翳膜

椒肆兩去子合者　甘菊花貳兩伍錢不用

熟乾地黃貳兩酒浸九蒸九曝

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三十丸食後細嚼新折米十餘粒送下

治吹妳方田仲寬方

治吹妳及一切惡瘡初覺一二日立効

生薑壹兩去皮　大黃　甘草已上各伍錢

萵蔞壹箇去皮

右共搗作一塊以水半椀同煎至七分濾去粗入

沒藥乳香末共二錢半通作一服

治痔瘡

雄黃伍分細研　五靈脂去石燒過去煙　五倍子炮過已上各壹錢

沒藥貳錢伍分明淨者　白礬半飛半生

右爲細末研令極細用紙花子貼瘡口上

洗痔

防風　當歸　川芎已上各等分

右三味剉細煎水去粗令熱溫淋洗瘡用輭帛印乾傳前藥

寸金丹

二名返魂丹三名再生丸四名追命丹五名延壽丸六名來甦丸七名知命丸八名得道丸非人勿示此方若有人患瘡身未爛者與三丸服之嚥下便活如口噤但斡開牙關研下三丸灌下喉中立生此方治發背腦疽癰腫遍身附骨腫痛先覺時飲水口中煩渴發熱四肢沉重身體壯熱

麝香 壹分　南乳香　烏金石

輕粉　雄黃　狗寶

沒藥 已上各壹錢　蟾酥 貳錢　粉霜

黃蠟 已上各叁錢　硇砂 伍錢　鯉魚膽 乾用

狗膽 已上各壹箇　金頭蜈蚣 柴條全者酥炙黃色 乾用

頭首兒孩兒乳 壹合

右件爲末除黃蠟乳汁二味熬成膏子同和丸如菉豆大小兒丸如芥子大每服一丸病重者加三丸白丁香七箇研爛新汲水調送下用衣服蓋之睡勿令透風汗出爲度大段疼痛如無頭瘡腫不過三服立効服藥後食白粥菰蘆就服大妙

牙疳藥 此藥是京兆惠民局見行經驗方

治大人小兒

揀信　青黛　輕粉 已上各壹錢

麝香 伍分

右同爲細末用小油調薄攤紙上用木鎚鎚實收起每用臨卧以漿水洗淨印乾可瘡口大小以藥紙封之至曉去藥紙嗽淨勿令嚥下大者不過三上必効

廻瘡蟾酥錠子 陝西醫局提舉馬雲卿親傳經驗方

治丁瘡毒氣攻心欲死以針刺其瘡向心行處但覺痛有血處下錠子若累刺至心側近皆不痛無血者急針百會穴痛有血者下錠子若無血以親人熱血代之猶活三四況瘡初發無有不効大抵

丁瘡生於四肢及胸背頭項骨節間唯胸背頭項最急初生痛痒不常中陷如丁蓋攝之有根壯熱惡心是也

天南星　款冬花　巴豆仁
黃丹　白信 已上各壹錢　獨活 伍分
班猫 去頭足拾箇

右為極細末用新蟾酥和藥如黍米大捻作錠子每遇丁瘡先以針刺其瘡必不知痛有血出者下錠子如覺痛不須再用若更不知痛再隨瘡所行處迎奪刺之至有血知痛即止其元瘡亦覺疼痛

以膏藥傳之膿出自愈

用錠子法度以銀作細筒子一箇約長三寸許隨針下至瘡痛處復以細銀絲子內藥於筒內推至痛處

乳香托裏散 同前所傳

治一切瘡腫疼痛不可忍如少壯氣實者先疎利後服之大效

御米殼去隔帶蒂蜜炙炒各兩　當歸

芍藥　川芎 已上伍錢　乳香

沒藥 已上各壹錢

右爲粗末每服五錢水一盞半煎至七分去相温服病在上者食後在下者食前若未止卽再服

四聖旋丁散 各醫秘傳經驗方

治丁瘡生於四肢其勢微者先以好醋調藥塗上以紙封之次服內托裏之藥其丁自旋出根

巴豆仁 伍分　白殭蠶　輕粉

硇砂 已上各貳錢伍分

右爲細末醋調用之

天丁散 同前秘傳經驗方

治一切丁瘡及諸惡瘡初生以藥塗之急服托裏

內消

山丹花葉　香白芷 已上各貳錢　牛蒡子根 春採去皮
天丁 乃皂角刺　蒼耳芽　大力子 已上各伍錢
雄黃 壹兩

右五月五日受氣修合為細末每用好醋塗紙封之丁瘡上有黑甲者必須胡桃油浸次塗之自可

萬應膏 同前所傳

治一切瘡瘍初生腫痛甚者無問大小以膏可腫痕貼之煎葱白水熱淋兩痛時良久再淋腫消為度如瘡老不能差者亦收斂聚膿決然早差

黃蘗　芍藥　白芷
黃芪　木鱉仁　杏仁
當歸　白芨　生地黃
官桂　玄參 去皮剉碎　沒藥
乳香 已上各伍錢研　白斂　黃蠟 已上各壹兩
黃芩　大黃 已上各貳兩　黃丹 壹斤
芝麻油 貳斤捌兩

右件十四味入油內浸一宿絶早入沙鍋慢火熬用生柳條攪至申時以焦褐色出火去粗粗又以重綿濾過入丹再熬旋滴水中成珠子不散者出

火毒絶煙入乳香没藥黃蠟攪勻用磁罌收貯於土內埋七日取出攤用

治小兒面湮瘡

俗云鍊銀瘡者是毋受胎之日食酸辣及邪味過度多生此瘡

百藥煎伍錢　生白礬二錢

右爲細末小油調旋搽之神効

治赤白口瘡

大人飢渴不時小兒失驚即生口瘡

生白礬一錢

右噙嗽之從瀝頑涎立効

治乾濕疥癬

此是肺受邪毒運於四肢久而不散以生肉蟲

硫黃一兩　生白礬八錢

右爲細末油調火炙抓破塗之立効

治湯火燒燙

無問新舊

青槐枝一兩剉碎　菉豆粉一兩炒黃色　輕粉一錢

右同爲細末油調塗之止痛減毒

治破傷風

手足顫掉不已者

硃砂 另研　南星 去臍　獨活 去皮已上各貳錢

人手足指甲 燒絶烟陸錢

右爲細末分作三服酒調服之立効

治破傷

無問新舊

石灰

右用一味驗瘡口大小儘乾塗之不須封裹神効

治風狗咬破傷風

此病非爲小可及九死一生之病可急用之

好班猫 柒箇去翅足

右爲細末酒調服之於小便盆内見衣沫似狗形者爲効如無再服七次雖無狗形亦不再發也此方累試經驗今附於此

論炮製諸藥及單方主療瘡腫法

夫藥者治病之物蓋流變在乎病主治在乎藥製用在乎人三者不可闕一也凡用一味炮炙修製及單方主療該引方書出處不必隨方標寫

硃砂

須研細水飛濾乾若入膏中者待熬膏成稍凝冷即下急攪勿令沉聚大凡石類一一如此

雲母

即須用鍊成熟粉曾經婦人手拈者不効聖惠方治湯火瘡羊髓和膏塗之神良千金方如治金瘡

及諸惡瘡依上塗傳大效

礬石　即白礬

凡用須木炭火上枯汁盡主陰蝕惡瘡去鼻中瘜肉生含嚥津治急喉閉肘後方治耳中卒腫痛或有膿水者以筒吹一字於耳中以綿塞之立効又治諸毒虫惡獸咬傷傳之則差千金方以醋煮湯潰蝎螫立差王氏博濟治驢馬汁毒傷人瘡腫痛和黃丹傳之靈苑方治傷折瘡腫以沸湯投枯礬漬浴之御藥院方治陰汗以枯礬投沸湯中浴之

水銀

主疥瘻痂傷白禿入膏令膏冷凝下之攪令勻散如星勿令沉聚

水銀粉 即輕粉

主瘰癧殺疥癬蟲酒齄風以羊髓和如膏塗及貼賺瘡一上可

石灰

主疥癬骨疽金瘡風化者良外臺秘要方治風疹以漿水調熱掃之隨手差孫真人治疥淋石灰水温洗之千年者尤佳

白麥飯石 即鷹嘴黃石

曾磨刀者佳凡用須用釅醋淬之令屑落醋中者良亦單用治發背神良本草曰大凡石類多主癰疽

花蕊石

主金瘡止血合硫黃木炭火炒良或只刮花蕊石末效

黃芪

主癰疽久敗瘡排膿止痛兼五痔鼠瘻止渴聖惠千金外臺秘要方治發背腦疽托裏止渴用黃芪六兩甘草一兩剉細水煎溫服無時大効

桑耳 即蒼耳

千金翼方丁腫用根莖葉炒灰存性爲末醋泔淀和如泥塗之一日三易之三日腫消根丁自拔出亦治諸腫掃之尋差

麻黃

凡用根節煮三沸掠去沫曝乾剉

黃芩

凡用去腐蘆揀細實者佳梅師方治諸丹作末水調掃之亦治湯火瘡

烏頭附子

凡用須炮裂去皮臍

半夏

凡用湯洗七次去滑

羊蹄根

主乾癬疥頭禿取根嚼塗之効簡要濟衆方治癬瘡久不差取新者絞汁和臘粉爲膏塗之千金聖惠外臺等方皆治癬和醋或白礬或硫黃塗之愈

狼毒

主癰疽惡瘡鼠瘻聖惠方治癬瘡積年搔之黃汁出痒痛以末傅之或猪膏和塗差

芭蕉根

主瘡腫搗根汁塗之良百一方治發背根汁塗之

土青木香 即馬兜苓根

治頭風搔痒禿瘡

連翹

主寒熱鼠瘻癰疽惡瘡癭癘同甘草服食

蒲公草

主乳癰煮汁飲之自消梅師方傳之亦消

滑石

本草不言療瘡腫本體較治諸瘡久不愈消熱毒

腫及金瘡血不止湯火炒瘡用之尤良

白石英

主肺癰吐膿咳嗽及膈上風熱痰肺癆消渴陰癆補五臟

赤石脂

治瘡疽痔瘻瀉痢加芎末等分粥飲調服一錢重神効寒者加乾薑服

白石脂

治癰疽排膿生肌新生兒臍濕

雄黃

主寒熱鼠瘻惡瘡疽痔死肌疥癬

硫黃

主女人陰蝕疽痔惡瘡疥癬殺虫

雌黃

主惡瘡疥頭禿下部蟲瘡殺虫

磁石

消癰腫主鼠瘻頸核喉痛

蜜陀僧

主金瘡止血口瘡疳瘻面上皯黯

伏龍肝

糝主惡瘡水調掃丹腫酒調封發背令內消

礬石

主寒熱鼠瘻惡瘡蝕肌死

黃石

搗末雞子清調敷丁腫丹瘤乳癰

麤理黃石 堪作碓碾者卽磨刀粗石

齊馬嗣明治楊遵彥發背取此石猛火煅赤投醯醋中因有屑落取爲末醋熬如糊厚塗立愈大凡石頭多主癰疽

爐甘石

王愈瘡止血治目赤瘡

燈心

主破傷血出每用貼破上封之立差

槐根皮

主痔及白皮煎湯薰浴良入荆芥尤妙

地骨皮

主疽瘡經年以粗皮煎湯洗之細沫白穰別碾參之即差

黃蘗

主瘡腫神良每用去粗皮塗蜜炙到諸方用作湯

漬陰瘡良搗末蜜水調敷腫

枳殼

凡用須麩炒去穰剉枳實亦同

厚朴

凡用須去粗皮生薑塗製炙微焦剉

皂角

凡用須不蛀者去黑皮弦子酥炙黃色剉

木鱉子

凡用去殼主惡瘡毒腫孫用和方治痔用仁三五枚研如泥以沸湯浸用汗先薰但通手即浴洗日

三度

楸樹白皮

單用熬膏貼癰疽惡瘡疳瘻痔疾用其白馬牙燒灰治發背初生用糝瘡頭上以膏封之

兎頭

連皮骨臘月細剉瓶中封之百日塗發腦疽發背惡瘡出百一方

兎腹下白毛

治湯火瘡已破者先用膠水掃之後用兎白毛貼之毛落平復勝金方治痔用玩月砂即兎糞也和

乳香末酒調三錢温服日三服即差

蜜

凡鍊須煎令沸掠去沫外臺治陰頭生瘡以蜜煎甘草末塗之神効肘後方單用塗湯火瘡

牡礪

凡用木炭灰炒通赤濕地上放經宿方用經驗方治瘰癧用牡礪四兩玄參三兩爲末糊丸如梧桐子大酒服三五十丸食後服藥盡患亦除根集驗方治一切癰腫水調牡礪粉掃之乾即再掃即消名抜毒散初虞世治瘰癧用和甘草末茶調三錢

服之神効大驗

蛇退皮

諸方用治丁雜惡瘡十年不較者全用炒存性豬膏和塗之其驗神効

蜘蛛

聖惠治瘰癧不問新舊或成瘻者瞼乾爲末酥和如糊貼之日三度大効千金治發背瘡亦治鼠瘻

神良譚氏治贅瘤疙瘩以網絲作線際根繫之一宿自落

蟭螟

聖惠治一切惡瘡端午日收乾爲末者油調傳之
神効子毋祕録治忽得惡瘡未辨識者取新者絞
汁傳其上大効古今諸方治丁瘡欲死者取蜣螂
心腹下度取之稍白者是以針刺丁瘡當心及四
畔以心塗貼之百苦立已經宿其丁自拔出大忌
食羊肉多不効
陳橘皮
凡用温水浸去白青橘皮亦然
枇杷葉
主嘔逆下氣凡用去毛刺甘草湯洗三葉重一兩

者佳

桃杏仁

凡用須湯浸去皮尖雙仁炒剉或研

無心草

凡用去蘆苗煎洗甲癥疽神効

防風

凡用去叉蘆

藜蘆

凡用去苗

犀角

凡用生不曾見火者即鎊錯爲末

茯苓

凡用去粗皮白者佳

芍藥

亦用白者佳

牽牛子

凡用黑成熟者微炒假如一斤取頭末四兩

外科精義卷下



寶太師流注指要賦

撰人未詳

本館據濟生拔萃本影印初編各叢書僅有此本

寶太師流注指要鍼

引云望聞問切推明得病之源補瀉迎隨揭示用鍼之要予於學始迄於今雖常覃思以研精竟未鉤玄而賾隱俄經傳之暇日承外舅之訓言云乃世紛孰非兵擾其人也神無依而心無定或病之精必奪而氣必衰兼萬國因亂而隔殊醫物絶商而那得設方有効歷市無求不若砭功立排疾勢乃以受教遂敏求師前後僅十七年一二無貧簡策後避屯於蔡邑方獲訣於李君斯人以鍼道救疾也除疼痛於目前愈瘵病於指下信所謂伏如彊弩應若發機萬聚萬全百發百中者也加之以好生之念素無竊利之心嘗謂予曰天寶不泄於非人聖道須傳於賢者僕不揆淺陋有求之懇獲成無吝之誠授穴之秘者四十有三療疾而弗瘳者萬無一失遂

銘諸心而著之髓務極其困而扶其危而後除疼痛迅若手拈破結聚渙如冰釋夫鍼也者果神矣哉然念玆穴腧而或忘借其聲律則易記輒裁八韻賦就一篇詎敢匿於己私庶或傳於同志

必欲治病莫如用鍼巧運神機之妙工開聖理之深外質砭金能蠲邪而扶正中含水火善迴陽而倒陰原夫絡別支殊經交錯綜會溝池谿谷以岐異或山海丘陵而隙共斯流派以難揆在條綱而有統理繁而昧縱補瀉以何功法捷而明自迎隨而得用行步艱移太衝最奇人中除脊督之強痛神門去心性之呆癡風痛頂急使求於風府頭暈目眩要覓於風池耳閉須聽會而治也眼疼必合谷以推之胷脇身黃取湧泉而即可腦昏目赤瀉鑽竹以偏宜但見若兩肘之拘攣杖曲池而平掃牙齒

痛呂細堪參頸項強承槩可保大白宣導於氣街陰陵開通於水道腹脹而脹奪內庭以休遲筋轉而疼瀉承山之在早大抵脚腕疼崑侖解愈股膝痛陰市能醫癇發顛狂艹憑後谿而料理瘧生寒熱艹仗間使以扶持期門罷會滿血膨而可以勞宮退胃翻心痛以何疑稽夫大敦去七疝之偏疼王公謂此三里却五勞之羸瘦華老言斯因知腕骨祛黃然骨瀉腎行間治膝腫目疾尺澤去肘疼筋緊自昏不見二間宜取鼻窒無聞迎香可引肩井除兩肿痛難任絲竹空療偏頭疼不忍刻敘寒疼列缺堪憑睛瞳冷淚臨泣尤准寬骨將腿疼以祛殘腎腧把腰疼而瀉盡以見越人治尸厥於維會隨手而甦文伯瀉胎死於三陰交應鍼而隕足表諸痛為實但麻曰虛實則自外而入也虛則從內而出於以故濟母而裨其不足奪子而平其有餘觀二

十七之經絡一二明辨據四百四之疾證件二皆除從此天枉都無臍斯民於壽域幾微已判彰往古之賢書抑又聞心胷病求掌後之大陵肩患責肘前之三里冷痺腎餘取足陽明之土連膞腹痛瀉足少陰之水脊間心後者鍼中渚而立痊脇下肋邊者刺陽陵而即止頭項擬後谿以安然腰脚在委中而已矣夫用鍼之士於此苟明者焉收却邪之功而在於撚指

離合真邪說

古有離合真邪云者蓋聖人欲使其邪相離而勿合之謂也若邪入於真則真受其蠹而不遂其純一之真真之不遂則其所謂真也雖害有不可言者真被乎邪竊其柄而肆其横逆之邪之既横則其邪為患復可勝言哉嗚呼真邪之不可合也如此胡為真胡為邪真之為言也天理流行付與萬

物萬物得以為生者皆真也聖人保之如持盈邪之為言也
天地間非四時五行之正氣而差舛迭至者皆邪也聖人避
之猶矢石其防微杜漸之嚴如是淵有旨哉蓋真立其邪遠
邪甚則真殘邪固可除真尤宜養養真之道無須異求但飲
食男女節之以限風寒暑濕御之以時復能戒慈怒以愛人
虛中襟而應物念慮必為之防舉止必為之敬如斯內外交
養周備則吾之生不求生而生無期壽而壽矣不然攝養少
或不嚴則六邪乘隙竟入諸疾交生衆苦並作則吾生之真
所與存者幾希故聖人憂之撰度權衡機宜所在示之以劑
邪之方使并之如雪污按劑而無遺者以此古人有云植德
務滋除惡務本以此意也然去邪之方經所俱存再拜遺詮
故為節錄

帝問邪氣在經其病何如取之奈何對曰邪之在經如水得風波濤洶起其行脉中循循然其中手也時大時小動無常處在陰與陽不可為度卒然逢之早遏其路吸則納鍼無令氣忤靜以久留無令邪布吸則轉鍼以得氣為故候呼引鍼呼盡乃去大氣皆出故命曰瀉

帝曰不足者補之奈何先必捫而循之切而散之推而按之彈而努之爪而下之通而取之外引其門以閉其神呼盡納鍼靜以久留以氣至為故如待所貴不知日暮其氣以至適而自護候吸引鍼氣不得出各在其處推闔其門令神氣存大氣留止故命曰補

諸穴治證

太衝肝經腧穴也在足大指本節後二寸或一寸半動脉中治

證已具在前

人中一穴在鼻柱下一名水溝督脉手陽明之會治消渴飲水無度水氣偏身腫失笑無時瀾漫語不識尊卑喜哀哭牙閉不開面腫脊動狀如蟲行卒中惡鍼入四分留五呼得氣即瀉又亦得神門心經腧穴也在掌後兌骨之端治證在前

風府一穴督脉陽維之會一名舌本在項髮際上一寸大筋內宛宛中疾言其肉立起言休立下禁不可灸不幸使人失瘖治頭痛頸項急不得迴顧目眩鼻衄喉鳴痛狂走目妄視鍼入三分

風池二穴在翳風後髮際陷中足少陽陽維之會治洒淅寒熱溫病汗不出目眩苦頭痛痎瘧頸項痛不得迴顧目淚出欠氣多鼻鼽衄目內眥赤痛氣發耳聾目不明腰偃僂引項筋無力不收鍼入七分留七呼灸七壯

聽會二穴在耳前陷中上關下一寸動脉宛宛中張口得之手少陽脉氣所發治耳聾耳中狀如蟬聲通耳食牙車脫日相離二寸其穴側卧張口取之鍼入七分留三呼得氣即瀉不須補久亦良日可灸五壯至二七壯止十日後依前復灸之即愈忌食動風之物

合谷一名虎口大腸經原穴也在大指次指骨間治證在前

湧泉腎經井穴也一名地衝在足心陷中治證在前

攢竹二穴一名始光光明眉柱在兩眉頭陷中足太陽脉氣所發治目瞤瞤視物不明眼中赤痛及臉瞤動鍼入一分留三呼瀉二吸徐徐而出鍼不宜灸宜以細三稜鍼刺之宜洩熱氣三度刺日大明忌如前

曲沈大腸經合穴也在肘治證在前

注細[illegible]

承漿一穴一名懸漿在頤前唇下宛宛中足陽明任脉之會療[illegible]風口喎面腫消渴口齒疳蝕生瘡灸亦佳日可灸七壯至七七壯止灸即血脉通宣其風應時立愈其艾炷不用大一依小竹筯頭作炷脉麤細狀如細線艾炷破肉但令當脉灸亦能愈疾凡灸臍下久冷疝瘕痃癖氣堰伏聚積氣宜灸炷大腹背宜五百壯四肢則但去風邪不宜多灸七壯至七七壯止不得過隨年數如巨闕鳩尾雖是胷腹之穴灸不過七七壯艾炷不須大以竹筯頭作炷正當脉上灸之若灸胷腹艾炷大灸多令人永無心力如頭項穴若灸多令人失精神臂脚穴灸多令人血脉枯竭四肢細瘦無力既復失精神又加於細瘦即脫人真氣鍼入三分得氣即瀉

太白穴足太陰脾經腧穴也在足側核骨下陷中治證在前
陰陵泉脾經合穴也在膝下內側輔骨下陷中治證在前
內庭胃經滎穴也在足大指次指外間陷中治證在前
承山膀胱經一名魚腸傷山肉付在兌腨腸下分肉間沿腰背
痛脚氣膝下腫轉筋鍼入七分可灸五壯
崑崙膀胱經經穴也在外踝後跟骨上陷中治證在前
陰市胃經在膝上三寸伏兎下治寒疝小腹痛脹滿腰已下伏
兎上寒如水鍼入三分忌灸
後谿小腸經腧穴也在小指外側本節後陷中治證在前
間使包絡經經穴也在掌後三寸兩筋間陷中治證在前
期門肝之募在兩乳第二肋端足太陰厥陰陰維之會治胷中
煩熱賁豚上下目青而嘔霍乱洩利腹堅硬大喘不得安則用

下積氣女子產餘疾食飲不下脅肋支滿心中切痛善噫若傷寒過經不解當鍼期門使經不傳鍼入四分可灸五壯
勞宮包絡經滎穴也在掌中屈指取之治證在前
大敦肝經井穴也在大指端爪甲如韭葉治證在前
內側為隱白外側為大敦
三里胃經合穴也在膝下三寸筋骨外廉內宛宛中治證在前
腕骨小腸原穴也在手外側腕骨前起骨下陷中治證在前
然骨腎經滎穴也在足內踝前大骨下陷中同前
行間肝經滎穴也在大指間動脉應手同前
尺澤肺經合穴也在肘約橫紋中同前
二間大腸經滎穴也在大指次指本節前陷中同前
迎香在禾髎上一寸鼻孔傍五分手足陽明之會治鼻有瘜肉

不聞香臭衄血偏風口喎面腫浮腫風動葉葉狀如虫行或唇腫痛鍼入三分留三呼不宜灸忌如常法

肩井在肩上陷缺盆上大骨前一寸半以三指按取之當中指下陷中者是一名髃井手足少陽陽維之會治五勞七傷頸項不得迴顧胷脾悶兩手不得向頭或因撲傷腰髖疼脚氣上攻甲乙經云秖可鍼入五分此髃井足陽明之會乃連入五藏氣若刺深則令人悶倒不識人即速須三里下氣先補不瀉須臾平復如故凡鍼肩井皆以三里下其氣若婦人墮胎後手足厥逆鍼肩井立愈若灸更勝鍼可灸七壯

經外空一名目髎在眉後陷中手足少陽脉氣所發禁不可灸不吉使人目小又令人目無所見治目眩頭痛目赤視物眩眩

灸留三呼直泻不宜補

列缺去腕側上一寸五分以手交叉頭指末筋骨罅中手太陰絡別走陽明療偏風口喎手腕無力半身不遂熱口噤不開寒瘧嘔沫善笑縱唇口健忘鍼入二分留三呼瀉五吸即可灸七壯慎如前

臨泣足少陽胆穴也在足小指次指本節後間陌中治證在前

髓骨膀胱經

腎腧在十四椎下兩傍相去各一寸五分與腎平治虛勞羸瘦耳聾腎虛水藏久冷心腹脹滿脇肋痛引少腹急痛目視晾晾少氣痰血小便濁出精陰中痠五勞七傷虛憊脚膝拘急足寒如冰頭重身熱捵慄腰中四肢煩燥洞泄食不化身腫如水鍼入三分留七呼可灸以年為壯

臨泣在目上直入髮際五分陷中足太陽少陽之會治卒中風不識人目眩鼻塞目生白翳多淚鍼入三分留七呼得氣即瀉
維會督脉
三陰交在內踝上三寸骨下陷中足太陰厥陰少陰之交會治痃癖腰中寒膝股內痛氣逆小便不利脾病身重四肢不舉腹脹腸鳴溏洩食不化女子漏下不止可灸三壯鍼入三分
太陵心包絡腧穴也在掌後兩筋間陷中治證在前
手三里在曲池下二寸按之肉起穴肉之端治手臂不仁肘掌不伸齒痛頰頷腫瘰癧可灸三壯鍼入二分
委中膀胱經合穴也在腘中央約紋中動脉治證在前
中渚三焦經腧穴也在手小指次指本節後間同前
瀉法先以左手揣按得穴以右手置鍼於穴下令病人咳欬一

聲撚鍼入腠理得宂令病人吸氣一口鍼至六分覺鍼沉濇復退至三四分再覺沉濇更退鍼一豆許仰手轉鍼頭向病所以手循經絡循捫至病所以合手以迎鍼引氣過鍼三寸隨呼徐徐出鍼勿閉其穴命之曰瀉

補法先以左手端揣按得宂以右手置鍼於宂令病人欬嗽一聲撚鍼入腠理得宂令病人呼氣一口將盡納鍼至八分覺鍼沉緊復退一分許如更覺沉緊仰手轉鍼頭向病所依前循捫其病所氣至病已隨吸而走出鍼速按其穴命之曰補

春夏秋冬深淺補瀉法春夏者皆先深而後淺秋冬者皆先淺而後深凡補瀉皆然

寒熱補瀉法

其補瀉皆如前法若病人患熱者若覺鍼氣至病所即退鍼三

二一分令病人口吸氣鼻出氣依經生成數足竟鍼下陰氣隆至依前法出鍼若病人患寒病者竟鍼氣至病所即進鍼至二三分令病人鼻吸口呼依本經生數足竟鍼下陽氣隆至依前法出鍼

灸法補瀉

氣盛則瀉之虛則補之以火補者母吹其火須自滅也以火瀉者疾吹其火傳其皮其火滅也

取寸法

取病人男左女右手中指第二節為內度兩橫紋相去為一寸

刺心痛諸穴

心痛引腰脊欲嘔刺足少陰

心痛腹脹大便不利刺取足太陰

心痛引小腹上下無常處便溺難刺足厥陰
心痛但短氣不足以息刺手太陰
太谿穴可灸三壯或五七壯此瀉熱厥心痛
崑崙穴可灸三壯或五七壯瀉熱厥痛

接經法

心痛與背相接善恐如從後觸其心偏僂者腎心痛也先刺京骨崑崙不已刺合谷
心痛腹脹胃滿心尤痛者胃心痛也刺大都太白二穴
心痛如錐刺乃心痛也刺然谷太谿
心痛突然如死狀終日不得休息乃肝心痛取行間太衝
心痛卧若徒居閒動作痛益甚其色不變此肺心痛也刺魚際太淵宣通氣行無所礙滯則病愈也

假令膽病善潔面青善怒得弦脉人病心下痛當刺膽井如見善潔面青善怒脉又弦人病身熱當刺膽滎如依前色脉人病体重節痛當刺膽俞如見善潔面青善怒脉又弦人病喘咳寒熱當刺膽經如依前色脉又病逆氣而洩當刺膽合餘經例皆倣此

假令肝病林溲難轉筋兼人病或心下痛或身熱或体重節痛或喘欬或逆氣而泄依前刺之謂刺肝經諸穴也脉沉而弦

假令小腸經病面赤口乾喜笑或心下痛刺井或身熱刺滎或体重節痛刺俞或喘欬寒熱刺經或逆氣而泄刺合脉浮而洪

假令心經病煩心心痛掌中熱而饑脉沉而洪或心下痛刺井或身熱刺滎或体重節痛刺俞或喘欬寒熱刺經或逆而泄刺合

假令胃經病面黃善噫善思善味脉浮而緩依上法刺之



王雲五主編

叢書集成初編

外科精義及其他一種

中華民國二十五年十二月初版

發行人 王雲五 上海河南路

印刷所 商務印書館 上海河南路

發行所 商務印書館 上海及各埠

*D六一四二